

Le Guide des Fruitiers

Nouvelle Édition

Pépinières Chatelain

50 route de Roissy 95 500 Le Thillay

Tel: 01 39 88 50 88 Fax: 01 39 92 86 52


E-mail : pepinieres.chatelain@caramail.com

Site web : pepinieres-chatelain.com



Fleur de pommier

Y. Rainisio



Bon Chrétien Williams

Y. Rainisio



Fleur de poirier


Y. Rainisio



Akane



Api Etoilé




Api Rose




Astrakan Rouge

Les fruitiers de forme libre que nous cultivons:



La tige :

Premières branches à 1.80 m du sol, à mettre en valeur comme un arbre isolé, sa hauteur permet d'avoir l'espace libre en dessous. Peut atteindre 4-8 m de hauteur et 3-5 m de largeur.



La 1/2 tige :


Premières branches à 1.50 m du sol, à mettre en isolé, sa hauteur permet de récolter les fruits sans trop de difficulté. Peut atteindre 3-5 m de hauteur et 3-5 m de largeur. Convient pour les jardins de taille moyenne.

Le fuseau :
Premières branches à 0.60 m du sol, de forme arbustive idéal pour les petits jardins, sa hauteur permet de récolter les fruits très facilement. Peut atteindre 3-4 m de hauteur et 1.5-2 m de largeur.



Les fruitiers formés que nous cultivons:

Les fruitiers formés étaient très répandus dans les jardins de nos grands-parents, nous les redécouvrons pour leur aspect ornemental qui associe le plaisir du regard à celui du goût.




Les cordons:

Pour les pommiers uniquement, sont idéals pour créer des allées dans votre potager ou votre jardin d'agrément. Vous pourrez jouer avec les différentes hauteurs 40 cm et 80 cm et leur aspect simple (1 branche) ou double (2 branches).




Le U simple:

Pour les pommiers et poiriers. Par sa petite taille, il atteindra maximum 2-2.5 m de hauteur pour 30-40 cm de largeur, il est idéal pour les petits jardins, à mettre en haie pour recouvrir un mur ou un grillage et mélanger plusieurs variétés de poirier et/ou pommier vous permettra une récolte abondante et variée qui vous satisfera.




La palmette verrier:

Pour les pommiers et poiriers, a les mêmes caractéristiques que le U simple, sauf qu'il est un peu plus large avec ses deux branches supplémentaires : 0.90-1.20m et il aura une fructification plus importante.



La palmette oblique

Pour les abricotiers, poiriers et pommiers, d'une hauteur et d'une largeur moyennes de 2 m à 2.50 m



Le U double

Pour les poiriers et les pommiers, d'une hauteur de 2 m à 2.50 m pour une largeur presque égale à celle du verrier.

Les conseils de plantation

Période : de novembre à avril sauf pendant les périodes de fortes gelées.

Suivant votre sol il faudra faire un apport différent de substrat à votre terre.

Sol pauvre : terreau plantation + or brun (l'or brun ne doit pas être en contact direct avec les racines le mélanger au terreau et le mettre en couche à 15 cm des racines)

Sol riche et lourd : tourbe blonde

Sol léger : terreau plantation + or brun

Le trou de plantation est à faire si possible à l'avance par temps sec ; pour laisser le sol s'aérer.

Le trou de plantation est à faire si possible à l'avance par temps sec pour laisser le sol s'aérer.



Y. Rainisio

Belle de Boskoop



Belle de Pontoise




Y. Rainisio

Belle Fille



Y. Rainisio

Belle Fleur Double



Faites un trou de plantation de 80 cm de largeur sur 60 cm de profondeur.

Taillez les branches :

♦ Pour les pommiers et les poiriers taillez de 2/3 les nouvelles pousses.

♦ Pour les autres fruitiers taillez de 1/3

Supprimez les racines blessées et rafraichissez les autres. Préparez un pralinage (mélangez dans une cuvette en plastique 70% de terre, 30% de tourbe + eau) faites y tremper les racines.

En aucun cas le pralinage ne se fait dans le trou de plantation

Placez votre tuteur face au vent dominant.

Rebouchez votre trou avec le mélange substrat terre.

Sur une terre raffermie (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière à ce que le point de greffe soit au dessus de la terre, afin d'anticiper le tassement.

Finissez de reboucher avec le mélange substrat terre en formant une cuvette, ainsi les futurs arrosages iront directement aux racines.

Les conseils de plantation

Les gros sujets, motte grillagée ou motte tontine coton :



Faites un trou de plantation de 80 cm de largeur sur 80 cm de profondeur, voir plus si c'est un très gros sujet.

Taillez les branches sur 1/3 des nouvelles pousses.

Sur une terre raffermissée (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière à ce que le point de greffe soit au-dessus de la terre, afin d'anticiper le tassement.

Manipulez la motte avec soin, faites attention de ne pas la casser, finissez de reboucher avec le mélange substrat terre en formant une cuvette. Placez votre tuteur de biais face au vent dominant.

La grillage et la tontine sont biodégradables, il ne faut en aucun cas les retirer. Seul le collet s'il est étranglé doit être dégagé par quelques coups de sécateur.



Les sujets en contenant

Faites un trou de 20 cm de plus que la taille du contenant en largeur et en profondeur. Taillez les branches sur 5 cm.

Rebouchez votre trou par le mélange substrat terre.

Sur une terre raffermissée (appuyez avec le pied) placez votre arbre de manière à ce que le point de greffe soit au-dessus de la terre, afin d'anticiper le tassement.

Manipulez la motte avec soin, faites attention de ne pas la casser lors du dégagement du contenant.

Finissez de reboucher avec le mélange substrat terre en formant une cuvette.

Placez votre tuteur de biais face au vent dominant.




Belle Fleur Jaune

Y. Rainisio



Belle Joséphine

Y. Rainisio



Bondy

Y. Rainisio



Borowitzky

Y. Rainisio



Calville Blanc



Calville Rouge



Canada Rouge




Colapuy


Cas particulier: Les fruitiers formés

Ils peuvent être livrés en racines nues, en motte ou en conteneur. Suivre les mêmes instructions, sauf que les trous seront moins importants : 50 cm de largeur sur 50 cm de profondeur et qu'il faudra les palisser sur un support (fil de fer + tuteur bambou) pour qu'ils gardent leur port. (à 30 cm du mur)


Pour les U Simple 3 fils de fer



Pour les verriers 3 à 4 fils de fer



Pour les cordons 1 fil de fer ou 2 si on met les deux hauteurs



Les conseils de plantation

*Après une plantation, arrosage copieux
pour tasser la terre naturellement.
Ensuite de mars à septembre arrosage (10 à 15 L d'eau par pied)
3 fois par semaine.*

*En fortes chaleurs, arrosage tous les jours.
Les végétaux sont à planter le plus rapidement possible.*

*Si vous retardez votre plantation :
mettre les sujets en racines nues et en motte
dans une jauge de sable ou de terre ameublie.
Ceux en conteneur seront mis à l'abri du vent et du gel.
Si c'est en début ou fin de saison surveiller l'arrosage.*

Certaines variétés de fruitiers ont besoin d'un pollinisateur pour donner une récolte plus importante.(cf. Tableau des variétés). Si aux alentours de votre jardin (environ 500 m) vous n'avez pas la variété pollinisatrice, il est conseillé pour une meilleure récolte de la planter.

Distance de plantation entre les fruitiers

*Tige : 6 à 8m
½ tige : 6 à 8m
fuseau : 2 à 3m
Cordon simple : 2m
Cordon double : 3m
A simple : 1 à 1.40m
Verrier : 1.20 à 1.60m*



Les conseils phytosanitaires



Y. Rainisio

Fuji



Y. Rainisio

Gloster



Y. Rainisio

Golden Delicious



Y. Rainisio

Grand Alexandre

En période de végétation (avril à septembre):

Votre fruitier peut subir diverses attaques de la part des insectes : pucerons, chenilles, psylles (sur poirier), ...

Acarieus : araignées,...

maladies : oïdium, rouille, tavelure,...

Il est nécessaire de le traiter pour qu'il reste sain et en pleine forme et pour qu'il puisse vous assurer une bonne récolte.

Les traitements se font en pulvérisation sur le feuillage, par temps sec, mais pas trop chaud (20-25° c maxi). Il faut préférer les traitements systémiques (véhiculés dans la sève pendant 3 semaines) et totaux (action sur plusieurs insectes, acariens et maladies). Les traitements sont à renouveler toutes les 3 semaines, le dernier doit se faire 1 mois avant la récolte.

En période hivernale (décembre à février):

Appliquez en pulvérisation sur les branches et le tronc un traitement d'hiver ou de fin d'hiver (huiles) suivant l'époque.

Ce traitement permet d'éliminer les œufs des insectes et les champignons. En faisant ce traitement vous diminuerez ceux en période de végétation .

Si vous avez un doute sur une maladie, un insecte,...

n'hésitez pas à nous apporter un échantillon.

Nous ferons le diagnostic et nous vous conseillerons .

Les conseils de taille pour les fruitiers formés: Verrier, U simple, cordon

Ces fruitiers demandent une taille particulière, car ce sont des arbres qui en général ont une vigueur foliaire beaucoup moins importante, mais une fructification souvent très précoce et abondante. Leur taille s'effectue en quatre étapes :

La taille hivernale (de déc. à mars) : La taille trigemme demande avant tout une bonne maîtrise des notions de base sur les fruitiers, à savoir connaître et distinguer les organes végétatifs :




Granny Smith



Groseille



Gros Locard




Idared

Le Lexique des fruitiers (1): Les organes végétatifs



Jacques Lebel



James Grieve



Kidd's Orange Red



Marie-Madeleine

L'œil à bois : (= bourgeon à bois) il se trouve à l'aisselle des pétioles foliaires ou à l'extrémité du rameau. Il évolue en feuille, en pousse feuillée, en dard et rarement en bouton à fleurs.

L'œil latent : ce bourgeon triangulaire, plat et peu visible se situe à la base des rameaux et ne produit que rarement une pousse.

L'œil stipulaire : souvent par paire autour d'un bourgeon à bois, il n'assure qu'une pousse de faible développement.

Le dard bisse : ce court rameau de 1 à 5 cm se termine par un bourgeon à bois. Il produit la première année une rosette et peu évoluer, soit en bouton floral, soit en petite pousse feuillée.



La brindille : il s'agit d'un petit rameau de 15 à 20 cm de longueur, qui n'évoluera pas davantage. Son bourgeon apical peut éventuellement se transformer en bourgeon floral.

Le rameau à bois : résultat de l'allongement d'un œil à bois, il peut atteindre plus de 40 cm de longueur, il ne porte que des yeux à bois.

L'anticipé : rameau se développant la même année que la branche le portant.

Le gourmand : rameau très vigoureux se développant au sommet du coude d'une branche, ou encore à la base des charpentières à la suite d'une taille trop sévère.

La branche : issue du grossissement et de l'allongement d'un rameau ou d'un gourmand, elle constitue l'ossature de l'arbre.



Le Lexique des fruitiers (2): Les organes fructifères



Reine des Reinettes



Reinette Abry



Reinette Baumann



Reinette Blanche du Canada

Le bouton à fleurs : (= bouton à fruits) arrondi et plus gros que l'œil à bois, il se trouve seul, à deux, ou accompagné d'un œil à bois. Il renferme jusqu'à 5 à 6 fleurs, une seule fleur pour les pêcher

La lambourde : dard qui s'est transformé en un organe de 3 à 5 cm de longueur et qui se termine par un bouton floral.

La bourge : lambourde de plusieurs années qui a produit des fruits. Elle peut être gonflée et difforme, elle donne d'autres lambourdes et d'autres boutons floraux.





La coursonne : cette ramification peut porter à la fois des rameaux à bois, mais également des boutons à fleurs, des dards, de lambourdes et des brindilles. Résultat de la taille trigemme, c'est un élément essentiel sur lequel vous effectuerez la taille de fructification.

La brindille couronnée : c'est un rameau d'environ 15 cm portant plusieurs bourgeons à bois, mais terminé par un bouton floral. L'inclinaison de la branche sous le poids de ce futur fruit va favoriser le développement des bourgeons à bois de la brindille, en bourgeons à fleurs.

Le bouquet de Mai : (espèces à noyau uniquement) organe court, de 1 à 5 cm de longueur, comportant 4 à 6 boutons floraux et un bourgeon à bois terminal.

La chiffonne : (espèces à noyau uniquement) rameau de 6 à 15 cm comportant 8 à 12 boutons floraux et un œil à bois à son extrémité et parfois un autre à sa base.

Le rameau mixte : (espèces à noyau uniquement) rameau de 30 à 50 cm portant des bourgeons à bois et des boutons floraux.



Particularités

Cas du développement de deux anticipés après le premier pincement :

- Pincez à 4 feuilles pour l'anticipé de base.
- Pincez à 2 feuilles pour l'anticipé le plus éloigné de la branche.

Cas du développement de trois anticipés après le premier pincement :

- Pincez à 4 feuilles pour l'anticipé de base.
- Supprimez totalement les deux autres pousses



Reinette du Mans




Rouge de Trèves



Royal Gala



Sans Pareil de Peasgood



Cas du développement d'une seule pousse :

- Pincez à 5 feuilles pour les variétés moyennement vigoureuses.
 - Pincez à 7 feuilles pour les variétés vigoureuses.
- Les 2 yeux de base restent latents, ou se transforment en dards.



Cas du développement de deux pousses :

- Supprimez totalement la pousse d'extrémité.
- Pincez la pousse restante à 4 feuilles.


Cas du développement de trois pousses :

- Pincez à 4 feuilles pour la pousse située à l'extrémité.
- Supprimez totalement les deux autres pousses.




La taille trigemme (hiver)

Effectuez une taille à 3 yeux : conservez les yeux à fruits (dards, bourses, lambourdes et brindilles couronnées) et supprimez les gourmands et les rameaux à bois trop vigoureux. Taillez les branches charpentières au niveau de leur prolongement, en taillant plus court les deux branches du milieu pour les verriers.



Rameau raccourci à 3 yeux en hiver




Le pincement en vert (été)

Premier pincement : (mai / juin)

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



2 yeux visibles




Deuxième pincement : (juillet)

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



Troisième pincement : (Août / septembre)

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux et palissez les prolongements avec du raphia naturel ou synthétique



Cas de jeunes pousses se développant sur un bouquet de jeunes fruits

Chat Rôti

- Pincez à 2 feuilles ces jeunes pousses, en mai



Beuré Hardy

Y. Rainisio




Beurré Lebrun

Y. Rainisio




Bon Chrétien Williams

Y. Rainisio



Catillac



Chat Rôti



Clapp's Favourite

Conseils de taille pour les fruitiers de forme libre **Tige, 1/2 tige, fuseau**

Pour tous les fruitiers à noyau (cerisier, prunier, abricotier, pêcher): pas de taille sévère, seuls les rameaux à bois qui ne donnent aucun fruit (gourmands), ou ceux qui deviennent trop envahissants pourront être supprimés.

Les pruniers et cerisiers seront élagués seulement 1 à 2 fois dans leur existence, juste après la récolte.

Pour les pommiers et les poiriers : pas de taille spéciale, supprimez les branches trop envahissantes ou trop gourmandes (rameaux qui ne donnent aucun fruit).


Pour les pêchers et les abricotiers : effectuez une taille dite en crochet tous les ans.

Objectifs de la taille en crochet

La taille doit inciter chaque année à la production de bois nouveau, avec des rameaux mixtes et des chiffonnes situées le plus près possible de l'axe (il faut éliminer le bois qui a porté des fruits et qui n'en produira plus).

Elle permet d'éviter le dégarnissement de la base des branches et des rameaux en bourgeons à bois.

Elle a pour intérêt d'équilibrer le nombre de boutons floraux, donc de fruit sur chaque rameau mixte.





Y. Rainisio

Doyenné du Comice



Y. Rainisio

Duchesse d'Angoulême



Y. Rainisio

Général Leclerc

Quelques rappels physiologiques

Les organes fructifères du pêcher (chiffonne, rameaux mixtes...) se forment la même année que les rameaux qui les portent. Il faut toutefois attendre un an pour que ces boutons se transforment en fruits.

- Les bourgeons à bois ne se forment pas sur du bois âgé de un an ou plus, il est nécessaire de limiter l'allongement des anticipés, des rameaux à bois et mixtes, ainsi que des gourmands.

- Le bourgeon terminal s'allonge en rameau à bois (feuillé) et très rarement en rameau mixte, sauf s'il est incliné.

- Après la floraison, les bouquets de mai périssent l'année suivante, alors que les rameaux mixtes et les chiffonnes s'allongent.

L'éclaircissage

Il n'est pas obligatoire, mais permet d'avoir des fruits d'un calibre plus important, plus régulier, de supprimer ceux mal formés ou malades et d'avoir une production plus régulière tout au long de la vie de l'arbre.

Il est à effectuer pour les pommiers et les poiriers en mai-juin, à l'aide d'un sécateur, lorsque les fruits sont de la grosseur d'une noix. On conservera 2 fruits par bouquet en favorisant ceux du centre pour les pommiers, et ceux du pourtour pour les poiriers.

Attention, si votre arbre a peu de fruits, abstenez vous et vice versa s'il en est couvert. Il est à effectuer en avril-mai pour les pruniers, en secouant les branches vigoureusement on supprimera les fruits mal formés et mal fécondés.

Légende

Formes:

T: tige

½ T: ½ tige

F: Fuseau

V: Verrier

U: U simple

C: Cordon

Productivité:

1: médiocre

2: moyenne

3: bonne

4: Très bonne

5: Excellente



Floraison



Récolte



Nos coups de cœur



Variété à cuire

Les abricotiers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte				Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés
		Mars		Avril		Juillet		Août				
		1 ^{er} q.	2 ^e q.									
Luizet	Gros, orangé et pourpre côté soleil, chair ferme, sucrée, parfumée, juteuse									2	T, 1/2 T	autofertile
Rouge du Roussillon	Moyen, chair ferme et parfumée									2	T, 1/2 T	autofertile
Royal	Gros, chair ferme, sucrée et parfumée									3	T, 1/2 T	autofertile
Bergeron	Gros, acidulé, jaune safran, coloré de rouge à maturité, sucré									3	T, 1/2 T	autofertile
Pêche de Nancy	Gros, ovoïde orangé et carmin au soleil, chair à saveur de muscat									3	T, 1/2 T	autofertile
Polonais	Gros, pâle, chair fine, fondante, sucrée et parfumée									3	T, 1/2 T	autofertile

Les cerisiers

	Variétés	Caractéristiques	Floraison				Récolte				Productivité	Cultivé	Polinisateurs	
			Mars		Avril		Juin		Juillet					
			1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.				
BIGARREAU	Hâtif Burlat	Gros, rouge foncé, chair sucrée, ferme et juteuse										3	T, 1/2 T, F	Napoléon, G. d'Hedelfingen
	Moreau	Gros, noir, chair sucrée et ferme										2	T, 1/2 T, F	Napoléon
	Marmotte	Gros, rouge foncé, chair croquante et juteuse										3	T, 1/2 T, F	Moreau
	Blanc	Moyen, blanc jaunâtre, rouge clair au soleil, chair blanchâtre, très ferme, juteuse, fort sucrée, à peine acidulée										3	T, 1/2 T, F	
	Cœur de Pigeon	Gros, jaune et rouge, chair croquante et sucrée										2	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
	Géant d'Hedelfingen	Gros, rouge, chair sucrée et juteuse										2-3	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
	Marbré ou Tigre	Moyen, rouge strié de noir, chair rose, très ferme, juteuse											T, 1/2 T	
	Reverchon	Gros, rouge foncé, chair croquante et sucrée										2	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
	Napoléon	Gros, jaune et rose, chair croquante et sucrée										3	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
	Summit	Gros, rose pale, chair fondante et juteuse										3-4	T, 1/2 T	Autofertile
	Van	Enorme, rouge, chair sucrée, très juteuse et ferme										4	T, 1/2 T, F	Napoléon
Noir de Meched	Noir, chair ferme et sucrée										3	T, 1/2 T	H. Burlat, G. d'Hedelfingen	
AUTRES	Cerise Anglaise	Moyen, rouge, acide, juteux										2	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Guigne Early Rivers	Gros, rouge, sucré, juteux										2	T, 1/2 T, F	H. Burlat
	Cerise Reine Hortense	Gros, jaune clair et rouge, chair blanche, sucrée, acidulée										2	T, 1/2 T	Griotte de Montmorency
	Cerise Royale	Gros, rouge foncé										2	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Griotte de Montmorency	Moyen, acide, juteux										2	T, 1/2 T, F	Autofertile
	Griotte de la Toussaint	Moyen, unicolore d'un beau rouge vif, chair jaunâtre, molle, à filaments blanchâtres, fort acide et peu sucrée, récolte d'août à fin octobre										2	T, 1/2 T	

Les Nectarines et les Pêchers

	Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte					Productivité	Cultivé	
			Mars		Avril		Juillet		Août		Sept			
			1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.			2 ^e q.
NECTARINES	Fuzalode	Assez gros, coloré de rouge brillant, chair fondante, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T
	Nectarose	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Silver Lode	Gros, rouge, chair blanche, parfumée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Violet	Moyen, jaune et rouge à violet, chair rosée, excellente											3	T, 1/2 T, F
PECHERS	Amsden	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse, acidulée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Charles Ingouf	Gros, jaune pourpre, chair tendre, très fondante, juteuse, très sucrée, agréablement parfumée, très bonne											3	T, 1/2 T
	Incomparable Guilloux	Très gros, lavé de rouge, chair blanche, excellente											2	T, 1/2 T, F
	Redhaven	Gros, rouge, chair jaune, ferme, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T, F
	Redwing	Gros, chair fine, juteuse, fondante, sans acidité											4	T, 1/2 T
	Dixired	Gros, rouge, chair jaune, ferme et juteuse											2	T, 1/2 T, F
	Grosse Mignonne	Très gros, rouge, chair juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Michelini	Gros, rouge, chair blanche, douce et parfumée											2	T, 1/2 T
	Suncrest	Gros, jaune, chair sucrée, parfumée, excellente											3	T, 1/2 T
	J-H Hale	Gros, rouge, chair jaune, ferme, parfumée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Belle Impériale	Gros, jaune carminé au soleil, chair blanche											2	T, 1/2 T, F
	Reine des Vergers	Gros, maculé de rouge, chair blanche, fine, sucrée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Sanguine	Moyen, violet sombre, chair à filaments sanguins, douce, fondante, parfumée											4	Autofertile
Téton de Vénus	Gros, blanc jaunâtre et rouge brun au soleil, chair blanchâtre, très sucrée, juteuse											3	T, 1/2 T	

Les Poiriers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte					Productivité	Polinisateur recommandés		
		Avril		Jul	Août		Sept				Oct.	
		1 ^{er} q.	2 ^e q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.			1 ^{er} q.	2 ^e q.
André Desportes	Moyen, jaune verdâtre lavé de rose, chair très fine, juteuse, sucrée										3	L.B. d'Avranches, B.C. Williams
Beurré Giffard	Moyen, jaune verdâtre ponctué de rouge terne au soleil, chair fine, fondante, sucrée, acidulée, faiblement parfumée										3	J. Guyot, B.C. Williams, B. Esperen, P. de Trévoux
Dr Jules Guyot 	Assez gros, vert clair, jaune à maturité, chair parfumée, sucrée et juteuse										2	Le Lectier, B.C. Williams, Conférence, D. du Comice
Bon Chrétien Williams 	Gros, jaune doré, chair fine, fondante, très sucrée et juteuse										3	Conférence, D. du Comice, J. Guyot, Epine du Mas, G. Leclerc, Passe Crassane
Clapp's Favourite 	Gros, rouge au soleil, chair fine, fondante, sucrée et juteuse										3	L.B. d'Avranches, B. Clairgeau, Le Lectier, B.C Williams
Triomphe de Vienne 	Gros, jaune vif, chair fine, fondante, sucrée et très juteuse										3	Conférence, D. du Comice, Clapp's Favourite, C. de Paris, J. Guyot, B.C. Williams
Williams Rouge	Assez gros, rouge veiné de jaune, chair très fine, fondante, parfumée et musquée										2	Epine du Mas, Conférence, D. du Comice, J. Guyot
Général Leclerc	Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée										3	Conférence, D. du Comice, B.C. Williams
Grand Champion	Fruit trapu, bronzé avec traces rosées, chair fine, fondante, juteuse, sucrée										1-2	Conférence, D. du Comice, J. Guyot
Beurré Hardy 	Gros, jaune verdâtre recouvert de rouge bronzé, chair fine, sucrée, juteuse										3	B.C. Williams, Conférence, B. Clairgeau, B. Giffard, Passe Crassane
Beurré Lebrun	Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée										2	D. du Comice
Packham's Triumph	Moyen, jaune à maturité avec des tâches de roussissure, chair fine, fondante, acidulée, peu sucrée										4	B.C. Williams
Conférence 	Moyen, jaune verdâtre, chair fine, fondante, parfumée et juteuse										4	B.C. Williams, B. Hardy, L.B. d'Avranches, D. du Comice
Louise Bonne d'Avranches 	Gros, vert jaunâtre, ponctuée de rouge au soleil, chair mi-fine, acidulée										4	B. Hardy, Clapp's Favourite, B. Clairgeau, D. d'Angoulême

Les Poiriers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Polinisateurs recommandés		
		Avril		Juil		Août		Sept				Oct.	
		1 ^{re} q.	2 ^e q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.			2 ^e q.	1 ^{re} q.
Sucrée de Montluçon	Moyen, jaune frappé de rose, chair blanchâtre, juteuse											4	Toutes variétés
Conseiller à la Cour	Gros, chair mi-fondante, juteuse											3	Autostérile
Epine du Mas	Moyen, jaune clair, chair juteuse, légèrement musquée, sucrée, bonne											4	B. Clairgeau, B. Hardy
Beurré Clairgeau	Gros, gris vermillon, chair mi-fine et parfumée											3	B.C. Williams
Catillac 	Très gros, jaune verdâtre maculé de brun, juteuse, peu sucrée											4	
Chat Rôti 	Moyen, jaune doré, chair dure et cassante, astringente												
Comtesse de Paris 	Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite, B. Hardy, Le Lectier, B.C. Williams
Curé  	Gros, jaune marbré de roux, chair mi-fine, assez sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite
Doyenné du Comice 	Gros, jaune vert, rouge à l'insolation, chair fine, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, B. Hardy, Conférence, L. B. d'Avranches, J. Guyot
Duchesse d'Angoulême 	Gros, jaune fauve, chair fondante, relevée, très sucrée et juteuse											3	B.C. Williams, Clapp's Favourite, L.B. d'Avranches
Jeanne d'Arc 	Gros, jaune, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, D. du Comice, Lézipont
Le Lectier 	Gros, vert jaunâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											2	B. Hardy, Clapp's Favourite, B.C. Williams
Passe Crassane 	Moyen, vert-jaunâtre ponctué de roux, chair fine, odorante, mi-fondante, saveur aigrelette, fort agréable											4	B. Clairgeau, B. Giffard, B. Hardy, Conférence, Epine du Mas, Packam's Triumph, B.C. Williams
Soldat Laboureur 	Gros, jaune d'or, mi-fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfumée											3	Curé, B.C. Williams, Passe Crassane

Les Pommiers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison			Récolte						Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés			
		Avril		Mai	Juil		Août		Sept					Oct.		
		1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.				2 ^e q.		
Astrakan Rouge	Moyen, carminé pruiné, chair fine, sucrée, un peu acidulée												3	T, 1/2 T	Belle Fleur Jaune	
Jacques Lebel 	Gros, vert jaune plaqué de fauve, chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, goût aigret très particulier													3	T, 1/2T	B. F. Jaune, R. Baumann, T. de Croncels
James Grieve	Moyen, jaune verdâtre à jaune marbré de brun rouge, chair fine, juteuse, acidulée, rafraichissante, arôme moyen														T, 1/2T	Idared, Cox's Orange, R. des Reinettes
Royal Gala	Moyen, entièrement strié de rouge carminé, chair jaune, ferme, croquante, juteuse, peu acidulée, douce et sucrée.													3	T, 1/2 T, F, V	—
Borowsky	Moyen, jaune clair strié de carmin, chair tendre et sucrée													2	T, 1/2 T, F, V	Transparente de Croncels
Akane	Moyen, jaune pâle lavé de carmin, chair croquante, juteuse, sucrée, à saveur excellente													2	T, 1/2 T, V	G. Delicious, G. Smith, Idared, R. des Reinettes, R.B. du Canada
Transparente de Croncels 	Moyen, jaune clair teinté de rose, chair fine, juteuse, acidulée et sucrée													2	T, 1/2 T, F, V, U, C	B.F. Jaune, W. Banana, Borowsky
Gloster 69	Moyen à gros, vert clair lavé de rouge violacé, chair croquante, sucrée, légèrement acidulée avec un arôme prononcé													3	T, 1/2 T	Akane, R. des Reinettes, G. Delicious, Melrose, G. Smith
Reinette Clochard	Moyenne, jaune tachée de rouille, chair ferme, très juteuse, sucrée, acidulée, très parfumée													3	T, 1/2T	R. des Reinettes, G. Delicious, R. de Caux
Api Etoilé	Petit, jaune d'or lavé de rouge brique, chair ferme, croquante, sucrée, rafraichissante													4	T, 1/2T	Bondy
Cox's Orange 	Moyen, jaune strié de rouge, chair fine, croquante, juteuse et sucrée													2	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, Winter Banana
Elstar	Moyen, jaune strié de rouge orangé, chair croquante, très sucrée, juteuse, avec une acidité rafraichissante														T, 1/2 T, F, V, U, C	G. Delicious, R. des Reinettes, Cox's Orange, Idared
Jonagold	Gros, rouge sur 1/3, chair ferme, juteuse et sucrée													4	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, Elstar, Gloster, Cox's Orange, James Grieve
Reinette Abry	Moyen, jaune clair ponctué de lenticelles, chair blanche, tendre et croquante, juteuse, peu parfumée, sucrée													4	T, 1/2T	Bondy
Reine des Reinettes 	Moyen, jaune lavé de carmin, chair fine, tendre et sucrée													3	T, 1/2 T, F, V, U, C	G. Delicious, Cox's Orange, R. Clochard, Calville Blanc, B.F. Jaune
Top Red	Moyen, entièrement lavé et strié de rouge violacé													3	T, 1/2 T, F, V, U	R. des Reinettes, Akane

Les Pommiers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte						Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés		
		Avril		Mai		Juil		Août		Sept					Oct.	
		1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.				1 ^{er} q.	2 ^e q.
Api Rose	Petit, jaune paille, chair très fine, croquante, juteuse, sucrée												4	T, 1/2T	Idared	
Golden Delicious	Moyen à gros, jaune d'or, chair fine, croquante, juteuse et sucrée												4-5	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, Akane, Cox's Orange, G. Smith, Melrose	
Grand Alexandre	Gros, jaune lavé de carmin, chair acidulée et sucrée												3	T, 1/2 T, C	Jonathan	
Marie Madeleine	Moyen, jaune d'or un peu verdâtre, chair jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, acidulée, sucrée et parfumée												4	T, 1/2T	Bondy	
Calville Rouge d'Hiver 	Gros, jaune pâle, rouge carmin à l'insolation, chair sucrée, acidulée, agréablement relevée, d'un parfum rafraîchissant												3	T, 1/2T, V, U, F	R. des Reinettes, G. Delicious,	
Colapuy	Moyen, vert et rouge puis jaune et rouge, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée												3	T, 1/2T	Bondy	
Mondial Gala	Moyen, lavé et strié de rouge, sucré, peu acidulé												3	T, 1/2T, V	Akane, R. des Reinettes, Elstar	
Reinette de Caux  	Gros, jaune d'or carminé et fauve, chair fine, croquante, juteuse et sucrée												2	T, 1/2 T, C	Richard, R. des Reinettes, R. Clochard	
Reinette du Mans 	Moyen, jaune clair, chair ferme, parfumée et sucrée												2	T, 1/2 T	G. delicious, Faros	
Belle de Boskoop  	Gros, jaune citron, lavé de pourpre, chair ferme, acidulée et assez sucrée												3	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, G. Delicious, Astrakan Rouge, Borowitsky, Winter Banana	
Belle de Pontoise	Très gros, jaune pâle teinté et granité de rouge, chair assez fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée												3	T, 1/2 T, V	Reinette Baumann	
Belle Fille	Moyen, jaune clair fauve et carminé au soleil, chair ferme, parfumée et sucrée												3	T, 1/2 T	Reinette du Mans	
Belle Fleur Jaune	Gros, jaune pâle parsemé de points gris-roux, chair fine, tendre, un peu acide												3	T, 1/2 T, F, V	Astrakan, Calville blanc, R. Baumann, T. de Croncels	
Calville Blanc 	Gros, jaune paille, chair fine, juteuse, parfumée et sucrée												2	T, 1/2 T, F, U	G. delicious, Cox's Orange, B. F. Jaune	
Granny Smith	Moyen, vert, chair ferme, croquante et acidulée												2	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, Melrose, Idared, Gloster	
Gros Locard	Gros, jaune ponctué de roux, chair tendre, juteuse, acidulée et sucrée												3	T, 1/2 T	Reine des Reinettes	

Les Pommiers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte				Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés				
		Avril		Mai		Juil		Août					Sept		Oct.	
		1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.				1 ^{er} q.	2 ^e q.	1 ^{er} q.	2 ^e q.
Melrose	Gros, rose à rouge, chair ferme, juteuse, parfumée et sucrée													2	T, 1/2 T, F, V, U, C	R.des Reinettes, G. Delicious, Calville Blanc, Gloster, Idared
Rambour d'Hiver	Gros, jaune pâle, carminé et fauve à l'insolation, chair mi-fine, sucrée, acidulée, peu parfumée													2	T, 1/2 T	Bondy
Reinette Baumann	Gros, jaune lavé de carmin et maculé de brun, chair acidulée et sucrée													3	T, 1/2 T, C	G. Smith, G. Delicious, Belle de Pontoise, B. F. Jaune, R. des Reinettes
Reinette Blanche du Canada	Gros, vert-jaune et fauve, chair fine, juteuse et parfumée													3	T, 1/2 T, F, V, U, C	G. Smith, G. Delicious, Cox's Orange, R. des Reinettes, Winter Banana
Reinette Grise du Canada	Gros, gris bronzé, chair ferme, parfumée, acidulée et sucrée													3	T, 1/2 T, F, V, U, C	G. Smith, G. Delicious, Calville Blanc, R. Baumann
Starking Delicious	Gros fruit, rouge sur la moitié et jaune pâle sur l'autre, chair ferme, fine, juteuse, peu acidulée, très parfumée													4	T, 1/2 T, F, V, U, C	Winter Banana, G. Delicious, Idared, G. Smith, Cox's Orange
Sans Pareil de Pe	Gros, jaune pâle rosé, chair tendre, parfumée et sucrée													2	T, 1/2 T, C	Transparente de Croncels
Winter Banana	Gros, jaune au soleil rouge, chair fine, ferme, sucrée, au parfum de banane													2	T, 1/2 T, F, V, C	R. des Reinettes, Astrakan Rouge, B.F. Jaune, Idared, R. de Caux, T. de Croncels
Belle Fleur Double (Belle Fleur Longue)	Moyen, carmin foncé, chair légèrement verdâtre, mi-fine, assez ferme et croquante, légèrement sucrée, faiblement acide													3	T, 1/2 T	
Belle Joséphine Rouge	Gros, jaune à rouge, chair ferme et sucrée													3	T, 1/2 T	Transparente de Croncels
Bondy	Moyen, jaune verdâtre lavé de rouge sur la partie ensoleillée, chair croquante, parfumée, juteuse, peu sucrée													2	T, 1/2 T	Belle de Pontoise
Carabiller	Moyen, jaune pâle recouvert de rouge noirâtre, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée														T, 1/2 T	
Court Pendu Gris	Moyen, jaune verdâtre, rouge brunâtre au soleil, chair jaunâtre, ferme, fine, croquante, bien sucrée et parfumée													2	T, 1/2 T	Reine des Reinettes
Fuji	Gros, vert-jaune à jaune, rouge par endroit, chair ferme, juteuse et sucrée													4	T, 1/2 T, F	G. Delicious, G. Smith, Mondial Gala, R. des Reinettes
Groseille	Gros, jaune-citron, lavé de rose plus ou moins foncé à l'insolation, chair ferme, croquante, juteuse, assez parfumée, peu sucrée, peu acidulée													2	T, 1/2T, V	Bondy
Idared	Gros, jaune strié à lavé de rouge, chair fine, juteuse, acidulée et peu sucrée													4	T, 1/2 T, F, V, U, C	R. des Reinettes, Melrose, Akane, G. Smith, Winter Banana
Reinette Dorée de Versailles	Moyen, chair blanche et croquante, légèrement parfumée													3	T, 1/2 T	Reine des Reinettes

Les Pommiers à cidre

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte						Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés			
		Avril		Mai		Juil		Août		Sept					Oct.		
		1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.	1 ^{re} q.	2 ^e q.				1 ^{re} q.	2 ^e q.	
Châtaignier Tendre	Moyen, jaune vert avec des rayures rouge, chair tendre, chair ferme et juteuse, variété à cidre															T, 1/2 T	
Châtaignier du Mesnil	Gros, blanc rosé, chair tendre, variété à cidre															T, 1/2 T	
Faro 	Moyen, rouge, chair fine, tendre, juteuse et sucrée, variété à cidre															T, 1/2 T	
Fréquin Audièvre	Moyen, rouge, pomme douce, variété à cidre															T, 1/2 T	
Peau de Vache	Moyen, vert pruiné, douce sucrée, variété à cidre															T, 1/2 T	
Rouge de Trèves	Fruit moyen, conique, rayé rouge sur fond jaune, pomme aigre, variété à cidre															T, 1/2 T	

Les Pruniers

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison						Récolte				Productivité	Cultivé en:	Polinisateurs recommandés	
		Mars		Avril		Juil	Août		Sept						
		1 ^o q.	2 ^o q.	1 ^o q.	2 ^o q.	2 ^o q.	1 ^o q.	2 ^o q.	1 ^o q.	2 ^o q.					
Bonne de Bry	Moyen, rouge noirâtre, chair jaune verdâtre, juteuse et sucrée												4	T, 1/2 T	R.C. Dorée, Queen Victoria
Reine Claude de Moissac	Moyen, jaune vert, chair ferme, très sucrée, légèrement acidulée												3	T, 1/2 T, F	Faiblement autofertile
Reine Claude d'Oullins	Gros, jaune verdâtre teinté de rose, chair tendre et sucrée												3	T, 1/2 T, F	R. C. d'Althan, Queen Victoria
Mirabelle de Metz	Petit, doré, marbré de rouge, chair parfumée et sucrée												2	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Mirabelle de Nancy	Moyen, jaune, marbré de rose, chair très parfumée et juteuse												3	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d' Oullins
Reine Claude Dorée	Moyen, jaune doré, chair très sucrée, parfumée et juteuse												3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bayav, R.C. d'Althan
Reine Claude Violette	Moyen, noir à reflets rougeâtres, chair fine, sucrée et juteuse												3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bayav, R.C. d'Althan
Damas Violet de Septembre	Moyen, violet noir, chair jaune orangé, parfumée et sucrée												3	T, 1/2 T	Auto incompatible
Mirabelle Parfumée de Septembre	Gros fruit, jaune clair rosé à l'insolation, chair ambrée, très juteuse, sucrée et parfumée												4	T, 1/2 T	Autofertile
Queen Victoria	Gros, pourpre violacé, chair parfumée, légèrement acidulée puis sucrée												3	T, 1/2 T	Autofertile
Quetsche d'Alsace	Moyen, pourpre violacé, chair ferme légèrement acidulée puis sucrée												3	T, 1/2 T, F	Mirabelle
Reine Claude d'Althan	Gros, rouge foncé noirâtre, chair fine, sucrée et parfumée												4	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d' Oullins
Reine Claude de Bayav	Moyen, jaune verdâtre, chair fine, sucrée, parfumée et juteuse												3	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Reine Claude de Chambourcy	Moyen, jaune verdâtre, chair parfumée, juteuse et sucrée												2	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Stanley	Gros, violet rougeâtre très foncé, chair ferme, sucrée												3	T, 1/2 T	Autofertile
Sainte Catherine	Moyen, jaune orangé, rosé à l'insolation, chair fondante, juteuse, sucrée, parfumée												2	T, 1/2 T	Faiblement autofertile

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE INTERNET

<http://www.pepinieres-chatelain.com>

*L'ensemble de nos productions, et parmi elles,
nos spécialités*

Des conseils et les évènements du mois

Les promotions du moment

NOUVEAU!

**VENTE EN LIGNE
DE FRUITIERS FORMES**



*Un grand choix de variétés et de formes, avec un
descriptif précis pour chacune*

*Une rubrique conseils pour l'entretien de vos
fruitiers: plantation, taille, suivi phytosanitaire*



Fleur de pommier



Fleur de poirier



Fleur de poirier

PARTICIPEZ AUX SAMEDIS DU JARDIN

*Conseils, astuces, idées, informations,
recommandations, les samedis du jardin sont
le rendez-vous de tous les jardiniers avertis ou
novices, qui souhaitent profiter de notre savoir-
faire et composer le jardin de leur rêve*

**INSCRIVEZ-VOUS,
PAR TELEPHONE, INTERNET
OU LORS D'UNE VISITE A LA PEPINIERIE**

ATELIERS GRATUITS

*Retrouvez le programme des samedis du jardin à
la pépinière ou sur notre site internet
[www. Pepinieres-chatelain.com](http://www.Pepinieres-chatelain.com)*

*Chaque année, un atelier « conseils de plantation »
et un atelier « taille des arbres fruitiers »*

La production fruitière aux Pépinières Chatelain

25 ha de culture fruitière aux Pépinières Chatelain



La production fruitière aux Pépinières Chatelain



Abricotier en palmette oblique



Poiriers sur tige



Reinette Grise du Canada




Fruitiers en cordons

Le greffage, une étape importante de la production fruitière



1-2 : Prélèvement de l'écusson



3-4-5 : Incision en T



6 : Pose du greffon

Les Remerciements

Nous tenons à remercier

M. M. Plévinage (directeur du Potager du Roi)

M. J. Beccaletto (responsable des cultures du Potager du Roi)

M. F. Moulin (responsable des cultures fruitières du Potager du Roi)

Le Potager du Roi

10 rue du Maréchal Joffre – 78 009 Versailles

La Chambre d'Agriculture d'Ile de France

et

M. J.-C. Hénin (Président de l'association)

M. Y. Rainisio (Photographe de l'association)

M. H. Fourey (Secrétaire adjoint de l'association)

L'Association des Croqueurs de Pommes d'Ile de France

24 rue Emile Zola

95 600 Caubonne – Tél: 01 39 59 14 28

Qui ont fortement contribué à la réalisation de ce guide



Y. Rainisio

Grand Champion



Y. Rainisio

Jeanne d'Arc



Y. Rainisio

Le Lectier



Y. Rainisio

**Louise Bonne
d'Avranches**



Y. Rainisio


Soldat Laboureur



Y. Rainisio

Triomphe de Vienne

PLAN D ACCES DU THILLAY



POUR ACCEDER AU THILLAY :

De paris : à porte de la Chapelle prendre l'autoroute A1, sortir à la sortie Senlis/Goussainville, suivre toujours la direction Goussainville, passer sous le pont de la N17, la jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.

De Pontoise : de la N184 Prendre l'A104 direction Charles De Gaulle, sortir à la sortie n°98 Senlis, au rond point prendre à droite la N 17 direction Gonesse, prendre la première sortie à droite D47a/902a, direction Goussainville. La jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.

De Marne-la- vallée : prendre l'A104 direction Charles De Gaulle, prendre ensuite l'A1 Lille/Charles De Gaulle, sortir à la sortie Senlis/Goussainville, suivre toujours la direction Goussainville, passer sous le pont de la N17, la jardinerie se trouve à 200 m sur votre gauche face à un château d'eau.

**Venez découvrir notre pépinière (jardinerie)
où nous exposons une grande partie de notre production**



Horaires :

Lundi de 14h00 à 19h00, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h30 à 19h00

Le dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00

En janvier, février, juillet et août jusqu'au 15 septembre:
du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00

Le dimanche de 10h30 à 13h00