


GRANDES PÉPINIÈRES



JOSEPH CARNET

AU MESNIL-AMELOT (S.-&M.)

(PRÈS PARIS)

Banlieue Nord — Gare de MITRY-CLAYE

GRANDES PÉPINIÈRES LÉON CARNET

Joseph CARNET

Fils et Successeur

AU MESNIL-AMELOT (S.-&-M.)

Bureau de Poste et Télégraphe :: Téléphone N° 2

COMPTE CHÈQUES POSTAUX 1347-23 PARIS

Adresse télégr. : JOSEPH-CARNET MESNIL-AMELOT

RÉCOMPENSES

obtenues aux différentes Expositions

EXPOSITION UNIVERSELLE 1900

10 Récompenses dont 4 Premiers Prix

PARIS 1910

Exposition Grand Palais Médaille d'Or.

PARIS

Exposition de Juin. Conifères { 1^{er} Prix.
2^e Prix.

PARIS

Exposition de Fruits. Septembre . . Grande Médaille d'Argent.

SEPTEMBRE 1912

Exposition d'Horticulture 3 Grands Prix d'Honneur.

EXPOSITION D'HORTICULTURE DE PARIS

Juin 1919

Prix d'Honneur — Objet d'Art

Grande Médaille d'Or (Paris 1919) — Grande Médaille d'Or (Paris 1920)

Grande Médaille d'Or (Paris 1921)

Grande Médaille d'Or (Paris 1923)

Et de nombreuses Récompenses aux Expositions (Voir suite p. 3 couverture)

JOSEPH CARNET, PÉPINIÉRISTE, AU MESNIL-AMELOT (S.-et-M.) 1

EXPÉDITIONS EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

La Maison se charge des expéditions en France et à l'Étranger.

Sa longue expérience et son installation spéciale pour exécuter les emballages lui permettent de faire, avec succès, les expéditions à destination des pays outre-mer.

AVIS

Les marchandises sont vendues prises à l'établissement.

Lorsqu'elles voyagent par chemin de fer, elles sont expédiées aux frais, risques et périls du destinataire.

Nous ne pouvons être rendus responsables des avaries, pertes ou retards survenus en cours de route, et les réclamations doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer, seules responsables.

L'emballage est coté au prix de revient et ne sera repris en aucun cas.

Pour éviter toute erreur, je prie instamment mes clients ou correspondants de vouloir bien écrire très lisiblement leurs nom et adresse, indiquer les voies de transport qu'ils désirent et désigner la gare la plus rapprochée de leur domicile ou le Bureau de Poste.

Livraisons par camion automobile et par voiture. — Ces modes de transport supprimant les frais d'emballage, de camionnage au départ et à l'arrivée, ainsi que les risques de retard, seront avantageusement employés pour toutes commandes ou groupes de commandes importantes dans la région limitrophe

Le prix en sera facturé au plus juste et suivant la distance et le poids à transporter.

Pour éviter tout retard préjudiciable à l'expédition, quand les *Plants* manqueront dans l'âge ou l'espèce demandée, je les remplacerai au mieux, par d'autres bonnes espèces analogues, à moins qu'on ait manifesté expressément l'opinion contraire.

Les plants demandés en collection et par unité subiront une augmentation de prix.

Mes factures sont toujours établies à prix net et payables dans le mois qui suit la livraison.

Les paiements peuvent être faits par chèque postal (Paris n° 1347-23) ou mandat-poste.

Mes traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement qui est le Mesnil-Amelot.

Toute réclamation, pour être admise, devra être faite dans les quatre jours suivant la réception.

Les végétaux, sauf convention préalable, sont vendus sans garantie de reprise.

ITINÉRAIRES de PARIS au MESNIL-AMELOT

*La distance de la Porte de la Villette (Paris)
au Mesnil-Amelot est de 22 kilomètres.*

Par auto-car Citroën, départ Rotonde de la Villette, route de Soissons, durée du parcours 0 h. 40.

Par voiture automobile prendre la route nationale n° 2, direction Soissons.

Par Chemin de fer Gare du Nord, descendre à Mitry-Claye (7 kilomètres du Mesnil-Amelot).

En me prévenant à l'avance de l'arrivée du train, une voiture attendra à la gare.

Je serai à mon établissement sur **Rendez-vous** et plus particulièrement les **lundi** et **samedi** à la disposition des personnes désirant visiter mes cultures.

DESSINS, TRACÉS ET PLANTATIONS

de Parcs et Jardins

à la disposition de mes Clients

CATALOGUE GÉNÉRAL

Pour les prix, consulter l'offre spéciale
incluse dans le présent Catalogue.

ABRICOTIERS (*Armeniaca vulgaris*)

L'Abricotier est de tous les arbres à fruits celui qui s'accommode le moins bien d'une taille raisonnée, c'est pourquoi, il est le plus souvent cultivé en torme libre, demi-tige ou haute tige; néanmoins on peut aussi le cultiver en palmette.

Est très fertile et donne de beaux fruits en espalier; mais en lui donnant cette forme, il est sujet à la gomme qui porte atteinte à la végétation et sa charpente est parfois détruite.

Cultivé en plein vent, à exposition midi, à l'abri des vents froids et des gélées printanières, produit une récolte abondante et ses beaux fruits sont de qualité exquise.

On pratique la greffe sur Amandier ou sur Prunier. Sur ce dernier porte-greffe, est plus vigoureux, s'accommode de tous les terrains et est aussi moins sujet à prendre la gomme.

Basse tige, sujet de 1 an.

Haute tige, force ordinaire.

— forte, transplantée.

— formée en vase.

Demi-tige.

Palmette à 1 série.

— à 2 séries

(Il existe des sujets plus forts qui seront traités de gré à gré)

Désignation des Variétés

	MATURITÉ
Commun , fruit gros, bon, 1 ^{re} qualité pour confitures; fertile.	Juillet-août
Jacques , fruit moyen, très bon; fertile.	Mi-août
Liabaud , fruit gros, très bon; fertile.	Juillet
Luizet , fruit gros, très bon; fertile.	Juillet
Pêche de Nancy , fruit très gros, le meilleur, le plus estimé, excellent; fertile.	Fin août
Précoce de Bourbon , fruit très gros, très bon; fertile. . . .	Début juillet
— d'Espéren , fruit gros, très bon.	Juillet
— de Montplaisir , fruit gros, très bon.	Mi-juillet
Royal , fruit gros, très bon; fertile.	Fin juillet
Sucré de Holub , fruit très gros, très bon.	Août
Viart , fruit gros, très bon; fertile.	Mi-juillet

AMANDIERS (*Amygdalus communis*)

Le plus précoce des arbres fruitiers à noyau. Fleurit de très bonne heure sous notre climat. il est nécessaire de lui réserver une exposition chaude à l'abri des vents du Nord.

On ne le cultive qu'en forme haut de tige. Dans les terrains chauds et secs, on le greffe en tête sur Amandier; en terre compacte et froide, on le greffe sur Prunier.

Princesse.

Commun.

— à coque tendre.

ASPERGES (*Asparagus officinalis*) plants ou griffes

Pour bien végéter et produire de belles Asperges, cette plante préfère les terrains légers, sablonneux, mais riches en humus; il faut éviter de faire une plantation dans les sols froids, compacts et humides.

Pour établir une aspergerie, il est indispensable de défoncer le terrain qui doit être meuble, substantiel et enrichi d'engrais organiques, fumier de ferme bien décomposé, ou engrais chimique complet (acide phosphorique, potasse et azote).

On peut préparer le terrain depuis octobre-novembre jusqu'en mars-avril époque de la plantation ou mise en place des griffes. Pour disposer ces dernières, on ouvre de petites tranchées d'environ 0^m30 de largeur et autant de profondeur, en observant un écartement de 0^m80 entre elles. Dans ces tranchées on établit de petits monticules, espacés les uns des autres d'environ 0^m80 sur lesquels on étale les griffes que l'on recouvre d'environ 0^m10 de bonne terre mélangée de terreau. On peut commencer à récolter dès la 3^{me} année de plantation.

Argenteuil (hâtive rose).

— (tardive).

— griffes pour forcer.

} Prix au cours.

BRUGNONS (*Voy. Pêchers*)CASSIS (*Voy. Groseilliers à fruits noirs*)CERISIERS (*Cerasus Avium*)

Presque tous les terrains lui conviennent, sauf ceux de nature argileuse, compacte ainsi que les sols humides et imperméables à l'excès. Les produits sont plus abondants et de qualité supérieure dans les terres légères argilo-calcaires ou argilo-siliceuses. Les sujets destinés à faire des arbres à haute tige doivent être greffés sur Merisier, alors que pour ceux en forme basse, on devra choisir le Mahaleb ou Sainte-Lucie comme porte-greffe.

Scion basse tige, sujet de 1 an.

Haute tige,

— formée en vase.

Pyramide.

Demi-tige.

Demi-tige forte.

Palmette formée à 1 série.

— — 2 séries.

— — 3 séries.

Désignation des Variétés

CERISES DOUCES

MATURITÉ

Anglaise hâtive, fruit gros, rouge foncé; très bon.	Juin
— tardive, ou Royale, fruit gros, rouge foncé vif; très bon.	Mi-Juillet
Belle de Montreuil, fruit gros, rouge marbré, sucré, fertile; très bon.	Juillet

Cerisiers (*Suite*)

MATURITÉ

Cerise d'Olivet, fruit gros, rouge, fertile; bon.	Juin
Duchesse de Palluau, fruit très gros, rouge vif, peu fertile; très bon.	Fin juin
Impératrice Eugénie, fruit gros, rouge foncé, fertile; très bon.	Mi-juin
Morello des Charmeux, fruit gros, rouge pourpre, très fertile; bon.	Août-sept.
Reine-Hortense, fruit très gros, rose foncé brillant; très bon.	Juillet

CERISES ACIDULÉES

Belle Magnifique, fruit très gros, rouge clair, doux, acidulé, fertile; bon.	Fin juillet
Griotte du Nord, fruit assez gros, rouge noir, très acidulé, fertile; bon.	Août
Montmorency à courte queue, fruit gros, rouge vif, recommandé pour conserves.	Juillet
— à longue queue, fruit gros, rouge foncé, recommandé pour conserves.	—
— de Sauvigny, fruit assez gros, peu acidulé, très cultivé en Champagne.	—

BIGARREAUX

Cœur de Pigeon, fruit très gros, peau jaune rosé, chair croquante; bon.	Fin juin
d'Aulnay, fruit moyen, rouge noir; très bon.	Fin juillet
Espéren, fruit gros, jaune et rouge, chair croquante; très bon.	Mi-juillet
Jaboulay, fruit gros, rouge foncé; très bon.	Mi-juin
Napoléon, fruit très gros, rose clair, chair croquante, très fertile; très bon.	Mi-juillet
Péllissier, fruit très gros, rouge foncé, sucré, ferme; très bon.	Fin juin
Perrault, fruit gros, jaune; bon.	Fin juillet
Précoce de Mai, fruit moyen, rouge grenat, très hâtif; bon.	Fin mai
Reverchon, fruit très gros, rouge vif; très bon.	Fin juin

GUIGNES

Beauté de l'Ohio, fruit gros, jaune rouge et ambré; bon.	Mi-juin
Belle d'Orléans, fruit gros, blanc rosé, très hâtif; bon.	Fin mai
Blanche, fruit gros, jaune blanchâtre; bon.	Fin juin
Early Rivers, fruit gros, rouge foncé; très bon.	Mi-juin
Noire de Tartarie, fruit gros, noir brillant; très bon.	Fin juin
— hâtive, fruit gros, rouge très foncé; très bon.	Mi-juin
Ramon Oliva, fruit très gros, rouge noir luisant; très bon.	—

CHATAIGNIERS (*Castanea Vesca*)

Cet arbre végète bien dans les terrains de nature silicicole ainsi que dans les terrains légers et frais. Redoute le calcaire.

Commun non greffé.

Marron de Lyon.

CHATAIGNIER DU JAPON

Variété nouvelle, originaire du Japon, d'où il a été importé il y a quelques années; arbre de proportions moyennes, à feuilles brillantes, dentelées. Son aspect est différent du Châtaignier d'Europe; il est très fertile et a supporté 25° de froid; commence à fructifier dès la seconde année.

COGNASSIERS (*Cydonia vulgaris*)

Le Cognassier n'a pas d'exigence sur la nature du terrain; il préfère cependant une bonne terre franche fraîche et substantielle.

On le greffe sur le Cognassier commun. Ses fruits sont utilisés pour faire des confitures ou des sirops.

Bourgeault. variété nouvelle.

Commun touffe.

du Portugal, tige.

Champion, très gros, tige. Variété originaire de Connecticut (État-Unis), beaucoup plus productive que le Cognassier de Portugal et rapportant des fruits plus gros.

CORMIERS (*Sorbus domestica*)

Croît en tous terrains. Peut être utilisé aussi bien comme arbre fruitier que pour l'ornement.

A gros fruits comestibles.

CORNOUILLERS (*Cornus Mas*)

Comme le précédent, pousse bien dans presque tous les terrains. Est employé aux mêmes usages.

Comestible.

A gros fruits rouges.

FIGUIERS (*Ficus Carica*)

Sous le climat de Paris, il convient de planter le Figuier à une exposition abritée et ensoleillée (midi).

Blanche hâtive d'Argenteuil, touffe moyenne.

Violette de la Frette, touffe moyenne et touffe très forte.

FRAISIERS (*Fragaria*)

A PETITS FRUITS (dits des Quatre-Saisons)

La multiplication des Fraisières se fait par graines et plus couramment par filets ou coulanis enracinés. La saison la plus favorable pour effectuer la plantation des filets est de septembre à mars, soit en bordures des allées, soit en planches, en observant un écartement de 0m30 à 0m35 entre les lignes et de 0m25 à 0m30 entre les plants.

Pour bien végéter, les Fraisières préfèrent un terrain plutôt frais, mais très perméable, car dans ceux de nature argileuse ou calcaire, compacte et humide, ils pourrissent pendant la saison d'hiver.

En terre douce et légère, bien meuble et substantielle, riche en engrais organiques, la production des fruits est abondante et soutenue dans les variétés dites des 4 saisons et les variétés remontantes à gros fruits.

Belle de Meaux, fruit rouge foncé, très parfumé, d'excellente qualité. Variété très productive.

Rouge améliorée, fruit d'un beau rouge, franchement remontante et de qualité exquise. Variété très fertile.

Buisson de Gaillon, à fruit rouge, sans filets.

— à fruit blanc, sans filets.

FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS

Saint-Antoine de Padoue.

La Fraise Saint-Antoine de Padoue se distingue par son port particulier; elle est vigoureuse dressée, bien dégagée du feuillage. Fruits très gros, de forme large, d'un goût excellent. Est remontante comme la variété Saint-Joseph; donne des fruits en abondance depuis l'été jusqu'aux gelées.

Livrable en beaux plants repiqués de septembre en mars.

Saint-Fiacre.

Variété vigoureuse, produisant de gros fruits oblongs, d'un beau rouge; chair ferme, saumonnée d'excellente qualité. La plus productive des variétés remontantes à gros fruits.

Saint-Joseph.

Cette variété a été obtenue par M. l'abbé Thivollet; elle est franchement remontante. Nous pouvons affirmer qu'elle a droit à tous les éloges que l'on en a fait; ses beaux fruits, gros, excellents, rouge foncé, ont la forme de cœur.

La production est aussi abondante que celle de la variété quatre-saisons ordinaire.

La Perle.

Moyen, rose vif, très sucrée et parfumée; excellent.



Fraise Vicomtesse Héricart de Thury

Fraisiers (Suite)

FRAISIERS NON REMONTANTS A GROS FRUITS

Docteur Morère, fruit très gros, rouge clair.

Goliath, fruit gros, rouge vermillon, tardive.

Madame Moutot, variété à gros fruits énormes, de forme presque ronde, côtelés, chair juteuse de bonne qualité. Appelée aussi Fraise tomate en raison de la grosseur des fruits.

Marguerite (Lebreton), fruit très gros, rouge vif.

Sir Joseph Paxton, fruit gros, rouge vif, cramoisi.

Sharpless, plante vigoureuse, rustique, maturité hâtive et prolongée, fruit très gros, de forme régulière, rouge brillant, chair rose vif, juteuse, sucrée, excellente.

Vicomtesse Héricart de Thury, fruit moyen, rouge, sucré, variété très rustique, donnant en abondance, maturité hâtive. Recommandable sous tous les rapports.

(Les Fraisiers ne se vendent pas par quantité inférieure à dix).

FRAMBOISIERS (*Rubus idæus*)

D'une culture facile et d'une fertilité remarquable. Prospère et fructifie bien dans tous les terrains et à toutes les expositions, aussi bien dans les terrains frais que dans les terres siliceuses ou calcaires légères, mais les fruits sont plus savoureux à une exposition ensoleillée en terrain sec. Fait l'objet d'une culture importante aux environs de Paris pour l'approvisionnement des halles et marchés.

Amélioré Congy, fruit très gros, d'un goût très fin; remontant: la récolte commence en juin et se continue jusqu'aux gelées.

Belle de Fontenay, rouge superbe; très bon; remontant.

Blanche de Souchet.

Merveille blanche.

— **des quatre-saisons**, fruit blanc, gros.

Souvenir de Désiré Bruneau, rouge très gros; remontant.

Surpasse Merveille, fruit blanc, gros.

— **Falstoff**, fruit rouge, gros.

GROSEILLIERS (*Ribes*)

Les Groseilliers croissent bien dans tous les terrains, cependant, la végétation est plus vigoureuse dans les sols frais et substantiels. On peut leur donner diverses formes: en buisson, en vase, greffé sur tige.

Tige.

Grande tige 1^m à 1^m30.

A GRAPPES

A fruits communs, fruit rouge, gros.

Belle de Saint-Gilles, fruit rouge, très gros.

Belle Versaillaise, fruit rouge, gros.

Blanche transparente, fruit blanc, très gros.

Cassis commun, fruit noir, gros.

— **Royal de Naples**, fruit noir, très gros.

Cerise, fruit rouge, très gros. La plus grosse des Groseilles.

Fay's New Prolific, fruit rouge, très beau; très fertile.

Fertile de Palluan, fruit rouge, gros.

Gloire des Sablons, fruit panaché, gros.

Impériale à fruit blanc, gros.

— à fruit rouge, gros.

Queen Victoria, à longues grappes, fruit rouge, gros.

A MAQUEREAUX OU ÉPINEUX

Variétés française et anglaise à gros fruits, avec nom.

White Smeth, bonne variété fertile à fruit blanc, d'excellente qualité.

Whinham Industry, variété très fertile, gros fruits rouge foncé à la maturité.



Framboisier amélioré Congy

KAKIS (Diospyros)

Les Kakis, sous le climat de Paris, doivent être plantés à bonne exposition chaude. Beau feuillage, fruit comestible de qualité exquise.

Coromaria, fruit rouge, parfumé, très bon.

Costata, fruit très gros, rouge, côtelé, très fertile, du volume d'une orange.

MARRONNIERS

(Voir à l'article Châtaigniers et aux arbres d'ornement)

MURIERS (Morus)

Pour obtenir de beaux arbres, il faut choisir un terrain bien exposé, chaud et sec. Est cultivé dans le Midi de la France pour la nourriture des vers à soie.

HAUTE TIGE. — BALIVEAU.

Noir à gros fruits
Blanc à vers à soie.

NÉFLIERS (Mespilus)

Greffé sur l'Aubépine, il pousse bien dans tous les sols, mêmes médiocres. La cueillette des fruits se fait en novembre; les nèfles blettes consommées en hiver sont savoureuses.

TIGE. — BALIVEAU. — SCION.

Commun.
A très gros fruits.

NOISETIERS (Corylus Avellana)

Dans tous les sols et à toutes les expositions, les Noisetiers végètent bien; ils préfèrent cependant les terrains légers, frais, et l'exposition du Nord. Leur feuillage vert ou pourpre et leur grande végétation, les placent parmi les nombreux arbustes d'ornement et leurs fruits sont aussi très recherchés.

TOUFFES.

Commun.
A feuilles pourpres.
A pellicules rouges.
Aveline grosse longue.
de Provence, quatre mendiants.
du Piémont.
Garibaldi.

Géante des Halles.
Impératrice Eugénie.
Impériale de Tréhizonde.
Nana.
Précoce de Frauendorf.
Princesse Royale.

NOYERS (Juglans)

Bien qu'ils croissent dans tous les terrains, les sols profonds et perméables sont ceux qu'ils préfèrent pour vivre longtemps et faire de beaux arbres.

TIGE. — BALIVEAU.

Commun.
de la Saint-Jean.
Præparturiensis (fertile).
Mésange, à coque tendre.

(Il existe des sujets très forts qui seront traités de gré à gré)

PÊCHERS (Amygdalus Persica)

En raison de sa nature frileuse, cultivé sous le climat de Paris, le Pêcher réclame l'abri de l'espalier exposé à l'Est ou mieux au Sud-Est. Les expositions Ouest ou Nord lui sont funestes.

En espalier on le cultive en lui donnant les formes palmette ou U; en plein vent, ce sont les formes haute-tige ou demi-tige qu'il convient de planter.

On greffe le Pêcher sur Amandier ou sur Prunier. Dans tous les sols profonds, argileux ou argilo-siliceux, substantiels et sains, on plante le Pêcher greffé sur Amandier et dans les terrains froids, humides et peu profonds on plante le Pêcher greffé sur Prunier; ce porte-greffe a des racines moins pivotantes qui végètent mieux dans la nature de ces terrains.

Greffé sur Amandier et planté dans les terrains indiqués, il produit une végétation luxuriante qui peut atteindre de grandes dimensions, et donner de nombreux et excellents fruits.

En plein vent, forme haute tige, nous recommandons les variétés : AMSDEN, GROSSE MIGNONNE, PRÉCOCE ALEXANDER, REINE DES VERGER et PRÉCOCE DE HALE.

SUJETS GREFFÉS SUR PRUNIERS

Haute tige. | **Demi-tige.**

SUJETS GREFFÉS SUR AMANDIER

Basse tige, sujet de 1 an. | **Palmette à 2 séries.**
Palmette à 1 série. | **Pêchers en U.**

SUJETS GREFFÉS SUR PRUNIER

Scion basse tige, sujet de 1 an. | **Palmette à 2 séries.**
Palmette à 1 série. | **Pêchers en U.**

Désignation des Variétés**PÊCHERS**

	MATURITÉ
Admirable jaune , fruit assez gros, globuleux, chair jaune; tr. bon.	Fin sept.
Alexis Lepère , fruit gros, chair jaune rosé, légèrement adhérente; très bon.	Mi-sept.
Amsden ou Pêche de Juin , fruit assez gros, chair rosée, souvent adhérente, la meilleure des pêches hâtives.	Mi-juillet
Ballet , fruit gros, chair blanche, rouge au noyau; très bon.	Fin sept.
Belle Beausse , fruit gros, chair blanc jaunâtre non adhérente; très bon.	Mi-sept.
— Impériale , fruit gros, superbe, bien sucré; très bon.	—
— de Vitry , fruit gros, chair non adhérente; très bon.	—
Bon Ouvrier , fruit gros, sphérique, chair juteuse; très bon.	Fin sept.
Chevreuse , fruit gros, chair non adhérente, fertile; très bon.	Fin août
Cumberland , fruit moyen, chair non adhérente; très bon.	Mi-juillet

Pêchers (Suite)

	MATURITÉ
Grosse Mignonne ordinaire , fruit gros, chair non adhérente; très renommée pour ses qualités.	Mi-août
— Mignonne hâtive , fruit gros, chair non adhérente; tr. bon	—
— Violette de Montreuil , fruit moyen, chair colorée, rosée; très bon.	Mi-sept.
Honeywell , fruit gros; très bon.	Mi-juillet
Le Vainqueur , fruit gros, très hâtif; très bon.	Fin juillet
Madeline rouge de Courson , fruit très gros, chair non adhérente; très bon.	Fin août
Monstrueuse de Doué , fruit très gros, globuleux, non adhérent; très bon.	—
Opoix , fruit gros, chair non adhérente, fine, sucrée, fertile; très bon	Mi-octobre
Pêcher pleureur , arbre d'agrément, donnant des fruits de qualité moyenne.	
Pourprée hâtive , fruit gros, chair non adhérente; très bon. . .	Mi-août
Précoce Alexander , fruit gros, une des meilleures pêches hâtives.	Mi-juillet
— de Hale , fruit gros, sphérique, chair pourpre au noyau; très bon.	Fin juillet
Reine des Vergers , fruit gros, chair non adhérente, très fertile pour plein vent.	Fin sept.
Rouge de Mai , fruit moyen, chair peu adhérente, assez fertile. .	Début uill.
Royale ou Bourdine , fruit moyen, chair non adhérente; tr. fertile.	Septembre
Sanguine , fruit moyen, chair à filaments sanguins; assez bonne.	—
Téton de Vénus , fruit gros, chair non adhérente, assez fertile; très bon.	Fin sept.
Vilmorin , fruit gros, chair pourpre vif au noyau, non adhérente; très bon.	Septembre
Waterloo , fruit gros, fertile.	Mi-juillet

BRUGNONS ou NECTARINES (Pêches lisses)

Fertile du Poitou , fruit gros, bon, non adhérent; fertile. . . .	Août
Galopin , fruit gros, bon, rouge au noyau, non adhérente; assez fertile.	Mi-sept.
Lord Napier , fruit gros, bon, chair blanche non adhérente; très fertile.	Fin août
Précoce de Croncels , fruit très gros, chair blanche non adhérente; fertile, plein vent.	Août
Rivers Orange , fruit gros, chair non adhérente; fertile. . . .	Mi-août
Standwich , fruit gros, chair non adhérente; peu fertile. . . .	Mi-sept.
Violet Musqué , fruit gros, chair sucrée; plein vent, très fertile.	—

POIRIERS (Pirus communis)

Le Poirier est le plus cultivé de tous les arbres fruitiers. De culture facile, croît à peu près dans tous les terrains et en lui donnant des diverses formes : en espalier et en plein vent.

Une bonne terre franche, profonde, à sous-sol perméable convient bien au Poirier.

On greffe le Poirier sur Franc et sur Cognassier. Greffés sur Franc, les arbres poussent vigoureusement et peuvent acquérir un grand développement, on les destine à la plantation en plein vent pour la forme haute tige. Greffés sur Cognassier, les Poiriers ont une végétation moins vigoureuse, par conséquent un développement moindre; ce porte-greffe fructifie plus tôt et donne des fruits plus gros, plus colorés et de qualité meilleure que les sujets greffés sur franc.

Dans les bonnes terres, même les froides et compactes, les alluvions, il convient de planter des Poiriers greffés sur Cognassier pour les formes moyennes.

On choisit le Poirier greffé sur Franc dans les plantations en terrain sec, de mauvaise qualité qu'il soit de nature siliceuse ou calcaire.

SUJETS GREFFÉS SUR FRANC

Basse tige, sujet de 1 an. | **Haute tige à couteau**. | **Haute tige forte**.

Poiriers formés sur franc

Palmettes à 1 étage	Palmettes à 1 étage (contre-plantées).
— 2 —	— 2 —
— 3 —	— 3 —
— 4 —	— —

Pyramides formées, 2 étages (contre-plantées sur franc).

— 3 —	— —
— 4 —	— —

Fuseaux 2 ans sur franc.

— 3 et 4 ans sur franc.	— —
— formés transplantés sur franc, 4 ans.	— —
— — 5 à 6 ans.	— —

Palmettes transplantées à 2 étages sur franc.

— 3 —	— —
-------	-----

Palmettes Verrier transplantées 3 branches.

— — —	très fortes.
— — —	4 branches.
— — —	très fortes.
— — —	à 5 branches (très fortes).

SUJETS GREFFÉS SUR COGNASSIER

Haute tige ordinaire.	Haute tige en palmette.
— sujet fort.	Demi-tige ordinaire.
— formée en vase.	Jeunes sujets d'un an.

Poiriers formés sur Cognassier

Pyramides à 1 étage.

— 2 étages.	— —
— formées et transplantées à 2 étages.	— —
— — 3 étages.	— —

Fuseaux de 2 ans.

— de 3 et 4 ans.	— —
— formés transplantés de 4 ans.	— —
— — 5 à 6 ans.	— —

Poiriers (Suite)

Palmettes à 1 étage oblique.

— 2 étages obliques.

— transplantées à 2 étages.

— — 3 étages.

— forme Verrier à 3 branches, transplantées.

— — — très fortes.

— — — à 4 branches.

— — — très fortes.

— — — 5 branches.

— — — très fortes.

— — en U.

— — en U transplantées.

— — en U double transplantées.

V pour losanges.

Cordons obliques 2 à 3 ans.

Cordons verticaux 2 et 3 ans.

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS**Juillet-Août**

André Desportes, fruit moyen, chair fine, juteuse, sucrée ; bon.

Beurré Giffard, moyen, chair fine, juteuse, sucrée, fruit de commerce ; bon.

Doyenné de Juillet, fruit petit, chair blanche, fondante ; bon.

Epargne, fruit moyen, chair blanche, juteuse, acidulée ; bon.

Madeleine (Citron des Carmes), fruit petit, chair mi-fine, sucrée, acidulée ; moyen.

Août-Septembre

Beurré d'Amanlis, fruit gros, chair mi-fine, juteuse, sucrée ; fertile ; très bon.

Bon Chrétien William's, fruit très gros, chair très fine, juteuse, musquée ; excellent.

Clapp's Favorite, fruit très gros, chair fine, très fondante, savoureuse ; très bon.

Docteur Jules Guyot, fruit gros, chair fine, juteuse, sucrée ; très bon.

Septembre-Octobre

Beurré gris doré, fruit moyen, chair fondante, juteuse ; très bon.

— **Hardy**, fruit gros, chair fine, juteuse, sucrée, fruit commerce ; excellent.

— **Lebrun**, fruit très gros, chair fondante, juteuse ; fertile ; très bon.

— **Superfin**, fruit gros, chair fine, sucrée, vigueur moyenne ; très bon.

Bonne d'Ezée, fruit gros, fondante ; très fertile ; bon.

Directeur Hardy, fruit gros, chair fine, juteuse ; très bon.

Doyenné Boussoch (Doyenné de Mérode), fruit gros, chair mi-fine, acidulée ; bon.

Louise-Bonne d'Avranches, fruit gros, chair très fine, fondante, sucrée ; excellent.

Triomphe de Vienne, fruit gros, chair fine, juteuse ; très bon.

Poiriers (Suite)**Choix des meilleures variétés (Suite)****Octobre-Novembre**

Baronne de Mello, fruit moyen, chair fine, juteuse, acidulée ; bon.

Belle Epine du Mas, fruit moyen ; très fertile ; bon.

Beurré Dumont, fruit gros, chair très fine, musquée, vigueur moyenne ; très bon.

— **Durondeau** (de Tongres), fruit gros, chair cassante, juteuse ; bon.

Conférence, fruit gros, chair mi-fine, fondante ; très bon.

Conseiller à la Cour, fruit gros, chair mi-fondante, juteuse ; bon.

Doyenné du Comice, fruit très gros, chair très fine, fondante, 1^{re} qualité ; excellent.

Duchesse d'Angoulême, fruit très gros, chair mi-fine, granuleuse, juteuse ; excellent.

Fondante de Panisel (Délices d'Hardenpont), fruit moyen, chair ferme, sucrée, vigueur moyenne ; bon.

Nec plus ultra Meuris (Beurré d'Anjou), fruit gros, chair fine, fondante ; très bon.

Nouveau Poiteau, fruit gros, chair blanche verdâtre, juteuse ; fertile ; bon.

Président Roosevelt, fruit très gros, chair fondante ; bon.

Soldat Laboureur, fruit moyen, chair juteuse, fine, sucrée ; très bon.

William's Duchesse, fruit très gros, chair fine, acidulée, juteuse ; bon.

Beurré d'Apremont (Beurré Bosc), fruit gros, chair parfumée, sucrée ; bon.

Novembre-Décembre

Beurré Bachelier, fruit très gros, chair fine, fondante, ferme ; très bon.

— **Clairgeau**, fruit très gros, coloré, chair mi-fine ; qualité variable.

— **Diel**, très fruit gros, chair mi-fondante, sucrée, fruit de commerce ; très bon.

Bergamotte Crassane, fruit moyen, chair mi-fine, juteuse ; fertile ; bon.

Charles Ernest, fruit gros, chair fine, fondante, parfumée ; fertile ; bon.

Triomphe de Jodoigne, fruit très gros, chair assez fine, juteuse ; bon.

Décembre-Janvier

Beurré d'Aremberg, fruit gros, chair très fine, se cultivant en espalier ; très bon.

— **de Naghin**, fruit gros, chair mi-fine, fondante ; bon.

Comtesse de Paris, fruit assez gros, chair fine, juteuse, relevée ; fertile ; très bon.

Figure d'Alençon, fruit gros, chair blanc verdâtre, mi-fine, très sucrée ; fertile ; bon.

Jeanne d'Arc, fruit très gros, chair très fine, fondante, relevée ; très bon.


Le Lectier, fruit très gros, chair très fondante, fine, sans granulation ; très bon.

Merveille Ribet, fruit gros, chair blanche, fine, parfumée ; bon.

Passe Colmar, fruit moyen, chair fine, ferme, sucrée ; bon.

Poiriers (Suite)**Choix des meilleurs variétés (Suite)****Janvier-Avril**

Bergamotte Espéren, fruit moyen, chair très juteuse, fine ; fertile ; très bon.
Doyenné d'Alençon, fruit moyen, chair beurrée, sucrée ; très bon,
 — **d'hiver**, fruit gros, chair fine beurrée, se cultive en espalier ; excellent
Joséphine de Malines, fruit moyen, chair très fine, sucrée, parfumée ; très bon.
Olivier de Serres, fruit moyen, chair fine, parfumée, fondante ; très bon.
Passe Crassane, fruit gros, chair fine, sucrée, saveur acidulée très agréable ; excellent.
Triomphe de Tournai, fruit assez gros, chair très fine ; très bon.



Poire Beurré Diel ou Magnifique

Poiriers (Suite)**POIRES A CUIRE**

à cultiver de préférence à haute tige ou plein vent

	MATURITÉ
Belle Angevine , fruit énorme et d'apparat	Janv.-avril
Belle des Abrès , fruit très gros, chair fine, sucrée.	Janv.-mars
Beurré d'Angleterre , fruit moyen, chair fine, acidulée, sucrée	Sept.-oct.
Catillac , fruit très gros, chair cassante, granuleuse, bien sucrée.	Janv.-mars
Chat Rôti , fruit moyen, chair granuleuse, sucrée.	Janv.-mars
Curé , fruit très gros, chair mi-fine, juteuse, excellent ; fertile.	Nov.-déc.
Martin sec , fruit petit ou moyen, chair cassante, sucrée	Déc.-janv.
Messire Jean , fruit moyen, chair grossière, cassante, très sucrée.	Oct.-nov.

VARIÉTÉS DE COLLECTION

disponibles sous petites formes ou greffons

Alexandre-III , fruit gros ; variété assez vigoureuse.	Février
Ananas , fruit moyen ; variété assez vigoureuse.	Septembre
Armand Morel , fruit gros ; variété peu vigoureuse	Mars
Angélique Cuvier , fruit moyen ; variété peu vigoureuse.	Sept.-oct.
Barillet Deschamps , fruit moyen, variété vigoureuse.	Février
Baltet Père , fruit gros ; variété vigoureuse ; fertile	Oct.-nov.
Bergamotte Hérault , fruit assez gros ; variété peu vigoureuse.	Novembre
Bési Chaumontel , fruit gros ; variété assez vigoureuse	Janvier
— de Montigny , fruit petit ; variété assez vigoureuse.	Oct.-nov.
— des Vétérans , fruit moyen, à compote ; variété vigoureuse.	Hiver
Beurré d'Août (Beurré blanc), fruit moyen ; var. peu vigour.	Août
— Bretonneau , fruit moyen, acidulé, à cuire ; assez fertile.	Mars
— Capiaumont , fruit moyen ; variété assez vigour. ; fertile	Fin sept.
— d'Albret , fruit moyen ; variété assez vigoureuse ; fertile	Sept.-oct.
— de l'Assomption , fruit gros ; variété peu vigoureuse.	Août-sept.
— Mortillet , fruit gros ; variété assez vigoureuse.	Août-sept.
— PICQUERY (des Urbanistes), fruit assez gros, chair fine ; bon	Oct.-nov.
— Six , fruit moyen, assez gros ; variété de moyenne vigueur	Nov.-déc.
— STERKMANS , fruit gros, variété vigoureuse ; fertile	—
Blanchet Claude , fruit moyen, sucré ; variété de moyenne vigueur.	Juillet
Bon Chrétien de Bruxelles , fruit gros ; variété vigoureuse ; fertile	Septembre
— d'Espagne , fruit gros ; variété très vigoureuse ; assez fertile.	Nov.-janv.
— hiver , fruit très gros, à cuire	Janv.-mars

Poiriers (Suite)

VARIÉTÉS DE COLLECTION (Suite)

	MATURITÉ
Bon Chrétien Napoléon , fruit gros ; variété assez vigoureuse ; peu fertile	Oct.-nov.
— de Rance , fruit très gros ; variété assez vigoureuse ; peu fertile	Nov.-février
— de Vermont , fruit gros ; variété assez vigoureuse	Octobre
Bon Vicaire , fruit gros et long, variété assez vigoureuse	Septembre
Broom Park , fruit moyen, variété peu vigoureuse	Janv.-févr.
Charles Cognée , fruit assez gros ; variété peu vigoureuse	Février
Clairvine , fruit assez gros ; variété assez vigoureuse	Mars
Colmar d'Aremberg , fruit très gros ; variété assez vigoureuse ; fertile	Oct.-nov.
— de Mars , fruit moyen ; variété assez vigoureuse	Mars
— des Invalides , fruit gros, à cuire, variété assez vigour	Janv.-mars
— d'hiver , fruit gros ; variété assez vigoureuse	Nov.-févr.
— Nélis , fruit moyen ; variété vigoureuse	Sept.-oct.
Comte de Flandre , fruit gros ; variété peu vigoureuse ; peu fertile	Sept.-oct.
Culotte de Suisse , fruit moyen ; variété vigoureuse ; très fertile	—
Délices d'Avril , fruit moyen, variété assez vigoureuse	Avril
Directeur Alphand , fruit très gros ; variété peu vigoureuse	Mars-avril
Doyenné d'Hylin , fruit gros, variété assez vigoureuse	Oct.-nov.
— M^{me} Cornuau , fruit moyen, juteuse, sucrée ; variété assez vigoureuse	Février
— Perrault , fruit gros ; variété vigoureuse ; fertile	Janv.-mars
— Sieulle , fruit gros ; variété vigoureuse	Janvier
Duchesse de Mouchy , fruit gros ; variété assez vigoureuse ; fertile	Déc.-janv.
— bronzée , fruit gros, à peau rude, caractère de la Duchesse	Oct.-janv.
— d'hiver , fruit gros, à cuire ; variété assez vigoureuse	Mars
FERDINAND GAILLARD , fruit assez gros, variété de moyenne vigueur ; fertile ; bon	Décembre
FONDANTE, DES BOIS , fruit gros, chair fine, fondante, juteuse ; variété assez vigoureuse	Sept.-oct.
Fondante Fougère , fruit moyen ; variété assez vigoureuse ; bon	Déc.-janv.
GÉNÉRAL TOTTLÉBEN , fruit très gros, variété très vigoureuse ; assez fertile ; bon	Oct.-nov.
Gros Saint-Michel , fruit gros ; variété assez vigoureuse ; fertile	Novembre
Idaho , fruit moyen ; variété assez vigoureuse	Octobre
Jules d'Airolles , fruit moyen variété vigoureuse ; assez fertile	Nov.-déc.
LA FRANCE , fruit moyen, chair sucrée, juteuse ; variété peu vigoureuse ; fertile ; bon	Oct.-déc.
Lehou-Grignon , fruit assez gros ; variété de vigueur moyenne	Févr.-avril
Madame Hutin , fruit moyen, variété très vigoureuse	Janv.-févr.
— TREYVES , fruit gros ; variété peu vigoureuse ; bon	Septembre

Poiriers (Suite)

VARIÉTÉS DE COLLECTION (Suite)

	MATURITÉ
MARGUERITE MARILLAT , fruit gros, variété peu vigoureuse ; assez fertile ; bon	Sept.-oct.
Marie-Louise d'Elcourt , fruit moyen ; variété peu vigoureuse ; fertile	Oct.-nov.
— d'Ucle , fruit gros ; variété assez vigoureuse	Octobre
NOTAIRE LEPIN , fruit assez gros ; variété assez vigoureuse ; fertile ; bon	Févr.-mars
Ognon , fruit petit ; variété vigoureuse ; fertile	Août
Orpheline d'Enghien , fruit moyen ; variété peu vigoureuse ; peu fertile	Janvier
Pie IX , fruit gros ; variété vigoureuse ; assez fertile	Octobre
PRÉCOCE DE TRÉVOUX , fruit moyen ; variété peu vigoureuse ; bon	Août
PRÉSIDENT DROUARD , fruit assez gros ; variété vigoureuse ; fertile ; bon	Janvier
— d'Estaintot , fruit moyen ; variété peu vigoureuse	Novembre
— Mas , fruit gros ; variété vigoureuse ; fertile	Déc.-janv.
Reine des Tardives , fruit moyen ; variété peu vigoureuse	Hiver
ROUSSELET DE REIMS , fruit petit ; variété vigoureuse ; très fertile ; bon	Septembre
SAINT-GERMAIN D'HIVER , fruit gros ; variété vigoureuse à cultiver en espalier ; bon	Nov.-mars
— Vauquelin , fruit gros ; variété vigoureuse	Janvier
SÉNATEUR BELLE , fruit moyen ; variété de vigueur moyenne	Avril
SEIGNEUR ESPÈREN (Bergamotte lucrative), fruit moyen, sucré, acidulé ; fertile ; bon	Sept.-oct.
Souvenir du Congrès , fruit gros ; variété peu vigoureuse	Août-sept.
— DE JULES GUINDON , fruit gros ; variété de vigueur moyenne ; bon	Mars
Sucré vert , fruit gros ; variété de vigueur moyenne ; assez fertile	Oct.-nov.
SUZETTE DE BAVAY , fruit moyen ; variété très vigoureuse ; fertile	Janv.-avril
Thomson , fruit gros ; variété assez vigoureuse ; fertile ; bon	Octobre
Triomphe de Touraine , fruit gros ; variété peu vigoureuse	Fin nov.
Van Mons Léon Leclerc , fruit très gros ; variété peu vigoureuse ; assez fertile ; bon	Oct.-nov.
Zéphirin Grégoire , fruit moyen ; variété assez vigoureuse	Déc.-janv.
Zoé , fruit moyen ; variété assez vigoureuse ; fertile	Hiver

POIRIERS A CIDRE

GREFFÉS SUR FRANC


Hautes tiges à cidre

Voir notre prix-courant pour force et prix


Désignation des Variétés

Carisis gros rond.


| Souris.



Palmette Verrier
à 4 branches.




Palmette Verrier
à 5 branches.




Pommier formé en cordon à 0=40 du sol.



Fuseau
ou colonue.



Palmette formée à 3 étages.



Forme en V pour losanges.

POMMIERS (Malus communis)

Bien que le Pommier soit un arbre de verger cultivé sous la forme de plein vent, il entre aussi dans la plantation des jardins fruitiers sous des formes diverses, plus petites.

Pour border les plates-bandes, ou limiter les carrés du jardin potager, on le plante sous la forme de cordon horizontal; il occupe peu de place et produit de beaux fruits.

Est aussi cultivé en espalier; dans cette plantation privilégiée à l'abri des murs, on lui donne la forme palmette, il produit alors des fruits plus beaux qu'en plein vent. Dans cette plantation, il faut donner la préférence aux variétés de choix, telles que : **Calville, Reinette du Canada, etc.**

On greffe le Pommier sur « Paradis » pour les arbres que l'on destine à faire des petites formes; sur « Doucin » pour les pyramides ou grandes palmettes plantées en terrain sec et de mauvaise qualité; et sur « Franc » pour les arbres destinés à la plantation des vergers, sous forme haute tige. Ce dernier porte-greffe acquiert un développement rapide dans les terrains argilo-calcaires ou argilo-siliceux.

GREFFÉS SUR PARADIS

Basse tige, sujet de 1 an.

—	—	de 2 ans pour cordons verticaux.
—	—	nain ou vase de 2 ans.
—	—	— de 3 et 4 ans.
—	—	cordons horizontaux à 1 côté 0m40 du sol.
—	—	— à 2 côtés —
—	—	— très forts.
—	—	— 1 côté 0m80 du sol.
—	—	— 2 côtés 0m80 —
—	—	— très forts.

Forme en V pour losanges

—	—	sujets forts.
---	---	---------------

GREFFÉS SUR DOUCIN

Basse tige, sujet de 1 an.

—	—	gobelet ou vase de 2 ans.
—	—	— fort.
—	—	pyramides à 1 étage.
—	—	— 2 étages formés, transplantées.
—	—	— 3 — —
—	—	fuseaux, 2 ans.
—	—	— 3 ans.
—	—	— 4 ans, formés, transplantés.
—	—	— 5 et 6 ans, formés, transplantés.
—	—	palmettes, 1 série oblique.
—	—	— 2 séries obliques.
—	—	— 2 séries, transplantées.
—	—	— 3 — —
—	—	palmettes Verrier, 3 branches transplantées.
—	—	— 4 — —
—	—	— — très fortes.
—	—	— 5 — —
—	—	— — très fortes.
—	—	— en U.
—	—	— en U, transplantées.

Pommiers (Suite)

GREFFÉS SUR DOUCIN (Suite)

Basse tige, cordons horizontaux à 1 côté 0m40 du sol.	—	—	—	2 côtés —
—	—	—	—	forts.
—	—	—	—	1 côté 0m80 du sol.
—	—	—	—	2 côtés —

Désignation des Variétés

POMMES D'ÉTÉ

	MATURITÉ
Astrakan rouge, fruit moyen, rouge cramoisi, le plus précoce; fertile.	Juillet
Borovitsky, fruit gros, jaune clair strié rouge; bon.	Août
Calville rouge d'Été, fruit moyen, rouge; bon.	Juillet-août
Beauty of Bath, fruit gros, très coloré, marbré; bon.	Juillet
Transparente blanche (Calville d'Été), fruit gros; bon.	Juillet
— de Croncels, fruit gros, blanc mat; très bon; fertile.	Août-sept.

POMMES D'AUTOMNE

Belle du Havre, fruit moyen, rouge brun; bon.	Sept.-oct.
Calville Garibaldi, fruit très gros, jaune; bon.	Octobre
— Saint-Sauveur, fruit très gros, rouge brun; bon.	Oct.-nov.
Cellini, fruit moyen, très coloré; fertile; bon.	Octobre
Grand Alexandre, fruit très gros, jaune lavé de carmin; fertile.	Sept.-oct.
Président de Fays Dumonceau, fruit très gros, jaune d'or rouge; bon.	Oct.-nov.
Rambour Été, fruit gros, strié rouge; bon.	Septembre
Reine des Reinettes, fruit gros, jaune strié vermillon; très fertile; très bon.	Nov.-janv.
Orange de Cox (Cox's Orange Pippin), gros, jaune marbré de rouge; très fertile; très bon.	—
Royale d'Angleterre, fruit gros, jaune orange et rouge clair; très bon.	Oct.-déc.
Sans Pareille de Peasgood, fruit très gros, jaune d'or, rouge cerise; bon.	Sept.-nov.

POMMES D'HIVER ET DE FIN D'HIVER

Apis Rose, fruit petit, jaune carminé; bon.	Janv.-avril
— Noir, fruit petit, rouge noirâtre; bon.	Déc.-avril
Belle de Boskoop, fruit moyen, rouge brique; fertile; très bon.	Déc.-févr.
— Joséphine, fruit très gros, jaune clair brun; fertile; bon.	Nov.-mars
— du Bois, fruit très gros, jaune maculé fauve; bon.	Déc.-mars

Pommiers (Suite)

Désignation des Variétés (Suite)

	MATURITÉ
Belle de Pontoise , fruit très gros, vert brun, rouge sombre au soleil ; bon	Févr.-mars
— fleur jaune (Lineous Pippin), fruit gros, jaune et rose tendre ; fertile ; bon	Déc.-février
Bismark , fruit très gros, jaune, rouge foncé ; bon	Nov.-déc.
Calville blanc (à côtes), fruit très gros, côtelé, jaune paille, rose tendre ; excellent	Déc.-mai
— Gloire de Doué , fruit gros ; bon	Janv.-mars
— Lesans , fruit assez gros, blanc crémeux ; fertile ; bon	Mars
— Rouge hiver , fruit assez gros, côtelé, rouge et carmin foncé ; fertile ; très bon	Novembre
Court pendu gris , fruit moyen, jaune verdâtre teinté rouge ; très bon	Nov.-mars
Delicious , fruit gros, rouge foncé, saveur délicieuse ; très fertile ; bon	Hiver
Fenouillet anisé , fruit petit, gris pourpré, chair croquante ; très bon	Déc.-avril
Framboise d'Holovous , fruit moyen, rouge ; assez fertile	Décembre
Jeanne Hardy , fruit très gros, côtelé, coloré rouge ; fertile ; bon	Déc.-janv.
Margille ou Reinette Musquée , fruit moyen, jaune gris ; très fertile	Nov.-févr.
Monstrueuse de Nikita (ménagère) ; fruit très gros, jaune pâle lavé de rouge ; assez bon	Déc.-janv.
Newton Wonder , fruit très gros, gris	Janv.-mars
Ontario , fruit gros, vert jaunâtre teinté rouge ; très bon	Nov.-déc.
Pigeonnet de Rouen , fruit moyen, jaune carminé ; très fertile	Nov.-janv.
Quétier , fruit très gros, blanc jaunâtre, chair très fine, sucrée ; bon	Janvier
Rambour d'hiver , fruit très gros, jaune paille, carmin ; bon	Nov.-mars
Reinette Cateau , fruit moyen, jaune fauve teinté rose ; fertile ; bon	Janv.-mars
— de Caux , fruit très gros, jaune carminé et fauve, chair très sucrée ; très bon	Déc.-avril
— dorée , fruit moyen, jaune d'or ; très fertile ; très bon	—
— de Bayeux , fruit moyen, jaune et rouge brique ; bon	Nov.-mars
— blanche du Canada , fruit très gros, jaune taché fauve ; très fertile ; excellent	Janv.-mars
— du Mans (de jaune), fruit assez gros, jaune roux, bon à deux fins ; très bon ; très fertile	Janv.-mai
— grise de Saintonge , fruit moyen, gris foncé ponctué ; chair jaunâtre, sucrée, anisée ; très bon	Janv.-avril
— grise de Versailles , fruit moyen, gris brun ponctué roux ; très bon	—

Pommiers (Suite)

Désignation des Variétés (suite)

	MATURITÉ
Reinette grise grosse , fruit gros, jaune brun ; très bon	Nov.-mars
— Baumann , fruit gros, rouge pourpré strié ; très fertile ; bon	Janv.-mars
— Franche , fruit moyen, vert gris roux ; fertile ; très bon	Déc.-avril
— grise du Canada , fruit très gros, vert gris brun ; fertile ; excellent	Nov.-avril
— Clochard , fruit moyen, jaune marbré rouge ; très bon	Févr.-mars
Surpasse Reinette , fruit gros, jaune gris ; très bon	Déc.-mars
Winter Banana , fruit moyen, jaune d'or teinté de rouge ; bon	Déc.-janv.
Yellow Newton Pippin , fruit moyen, brunâtre ; bon	Nov.-mars



Pomme Châtaignier de Gonesse ou Ravallac

Pommiers (Suite)

POMMES A DEUX FINS

POUR LA TABLE ET LA FABRICATION DU CIDRE

arbres vigoureux à gros rendements pour plein vent
cultivés à haute tige

	MATURITÉ
Belle fille rose, fruit moyen, jaune pâle rayé de rouge.	Janv.-mars
— Joséphine rouge, fruit très gros, jaune or rouge.	Oct.-nov.
— de Neufmontiers, fruit gros, rouge.	Nov.-déc.
Bondy, fruit moyen, jaune teinté rose.	Avril
Châtaignier Corvisier, fruit très gros, rouge brun.	Nov.-janv.
— de Meaux, fruit gros, rouge carmin.	Janvier
— Faro, fruit gros, jaune strié rouge.	Déc.-mars
— Gonesse ou Ravailiac, fruit gros, jaune rouge carmin.	Nov.-janv.
— tendre, fruit moyen ou gros, vert pâle, rouge brun.	Nov.-févr.
— tardif du Mesnil-Amelot, fruit gros, légèrement aplati, rouge cramoisi.	Janv.-avril
Colapuis, fruit gros, rouge brillant.	Nov.-mars
de datte, fruit moyen, aplati, rouge carmin.	Janv.-mars
de Fer, fruit gros, rouge brun.	—
de Méru rouge, fruit moyen, aplati, rouge foncé.	Nov.-déc.
de Vérité, fruit assez gros, rouge vif.	Janv.-avril
Feuilles mortes, fruit moyen, rouge.	—
Gendreville, fruit moyen, rouge.	—
Gros locard, fruit gros, globuleux, jaune rosé pointillé roux.	Déc.-mars
Reinette Abry, fruit moyen, jaune paille, rose tiqueté.	Nov.-déc.
— Faux-Canada, gros fruit, jaune maculé fauve.	—

POMMIERS TIGE A COUTEAU

Sujet ordinaire.

— fort.

Tige formée en vase.

POMMIERS TIGE A CIDRE

Sujet ordinaire.

— fort.

L'attention a été appelée d'une façon particulière, depuis quelques années, sur les variétés de Pommiers à cidre. — Ces variétés ont été étudiées avec soin par tous les Congrès pomologiques de l'Ouest, et en particulier par MM. Hauchecorne et de Boutteville; celles qui n'offraient pas les conditions requises ont été écartées.

Pour qu'une variété soit en effet recommandable, à tous points de vue, il faut :

1° Qu'elle produise beaucoup de fruits.

Pommiers à cidre (Suite)

2° Que le jus de ces fruits présente une densité de 10° Baumé avec au moins 5 millièmes de tannin, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires à la conservation du cidre.

3° Que l'arbre soit vigoureux et sain, avec une tige pyramidale, cette forme étant la plus avantageuse en ce qu'elle ombrage moins les récoltes et qu'elle met les branches hors de portée des bestiaux.

Les variétés que j'offre à mes clients sont presque toutes recommandées par MM. Hauchecorne et de Boutteville et sont cultivées avec plein succès dans le pays de Caux, le pays de Bray, la vallée d'Auge et le Cotentin.

A ces variétés je me suis permis d'en ajouter quelques-unes cultivées également avec succès dans l'Orne, la Sarthe et les départements du Nord de la France.

Quelques variétés étudiées par moi, et d'une vigueur extrême, y ont été aussi ajoutées. Cette collection, à tous les égards, est donc capable de satisfaire tous les désirs des amateurs de plantation de vergers.

Désignation des Variétés

Amer de Berthecourt, 2 ^e saison.	Jaunet pointu, 2 ^e saison.
— doux gris, 2 ^e saison.	Lavigny, 2 ^e saison.
Argile grise, 2 ^e saison.	Marie Madeleine, 2 ^e saisons.
— rouge, 2 ^e saison.	Marin Onfroy, 3 ^e saison.
Bedan des Parts, 3 ^e saison.	Médaille d'Or, 2 ^e saison.
Binet gris, 2 ^e saison.	Muscadet, 2 ^e saison.
— rouge, 2 ^e saison.	Peau de vache, 3 ^e saison.
— violet, 2 ^e saison.	Petit Muscadet, 2 ^e saison.
Blanc Mollet, 1 ^{re} saison.	Pin de Reinettes, 3 ^e saison.
Bramtôt, 3 ^e saison.	Pomme à tannin, 3 ^e saison.
Châtaignier de Bordeaux, 3 ^e saison.	— Godard, 2 ^e saison.
De Boutteville, 2 ^e saison.	— Michelin, 3 ^e saison.
Doux à l'Aiguel, 1 ^{re} saison.	Reine des hâtives, 1 ^{re} saison.
Fertile de Falaise, 2 ^e saison.	— des pommes, 2 ^e saison.
Fréquin amer, 2 ^e saison.	Reinette Abry, 1 ^{re} saison.
— Audièvre, 2 ^e saison.	Rouge Mollet, 3 ^e saison.
Gaillardot, 3 ^e saison.	— de Trèves, 2 ^e saison.
Grise Dieppoise, 3 ^e saison.	Rousse-Latour, 3 ^e saison.
Hauchecorne, 3 ^e saison.	Vendue-Lévêque, 3 ^e saison.
Jaunet de Gournay, 3 ^e saison.	

PRUNIER (Prunus Domestica)

Dans toutes les plantations d'arbres fruitiers, il convient de réserver quelques bonnes places au Prunier. Peu exigeant sur la nature du sol, par ses racines traçantes, il pousse bien dans tous les terrains, qu'ils soient argilo-siliceux ou argilo-calcaires. Les coteaux bien exposés et abrités des gelées printanières sont favorables à sa fructification. C'est en forme haute tige et en plein vent qu'il est ordinairement cultivé dans les vergers. Rarement en espalier.

Haute tige, ordinaire.	Basse tige, sujet d'un an.
— sujet fort.	— pyramide à 1 étage.
— transplantée.	— — 2 étages.
— formée en vase.	— palmette à 1 étage.
Demi-tige ordinaire.	— — 2 étages.
— forte.	

Pruniers (Suite)

Désignation des Variétés

	MATURITÉ
Abricotée jaune , fruit gros, jaune teinté rosé	Août
Belle de Louvain , fruit gros, ovale, pourpre violacé	Septembre
Bonne de Bry , fruit moyen, rouge noirâtre.	Fin juillet
Coe's Golden Drop , fruit très gros, jaune marbré rouge; très bon pour compote	Fin sept.
d'Agen , fruit moyen, allongé, rose pruiné, excellent pour pruneaux; fertile	Fin août
Domino , fruit petit, bleu, très bon pour confitures; très fertile. .	Septembre
Gloire d'Epinay , fruit gros, rouge noir pruiné; très fertile . . .	Mi-août
Jefferson , fruit assez gros, jaune lavé rose; bon.	Août-sept.
Kirkès noir , fruit gros, violet noir, sucré; bon.	—
Monsieur jaune , fruit moyen, jaune strié rouge; bon	Mi-août
— hâtif violet , fruit assez gros, rouge pourpre pruiné; bon.	Fin juillet
Mirabelle petite ou de Metz , fruit petit, jaune or marbré rouge, très fertile; très bon pour confitures	Mi-août
— grosse ou Mirabelle de Nancy , fruit moyen, jaune clair marbré rose, très bon.	Fin août
Pêche ou Nectarine , fruit très gros, rouge violacé; fertile. . . .	Fin juillet
Pond's seedling , fruit énorme, carmin foncé; fertile; bon cuit .	Mi-sept.
Questche d'Allemagne , fruit moyen, allongé, violet noir, pour pruneaux, compotes; fertile.	Septembre
— d'Italie , fruit moyen, allongé, violacé pruiné, pour pruneaux, tartes; fertile	Septembre
Reine-Claude d'Althan , fruit gros, arrondi, rose violacé; très bon.	Fin août
— de Bavay , fruit gros, jaune verdâtre, pruiné; bon.	Mi-sept.
— de Chambourcy , fruit moyen, vert taché de roux; très bon.	Fin sept.
— diaphane , fruit moyen, vert rose strié; très bon.	Fin août
— dorée , fruit moyen, jaune lavé rouge lilacé, la meilleure pour la table et les confitures; excell.	Mi-août
— monstrueuse d'Oullins , fruit gros, jaune verdâtre; très bon	Fin juillet
— verte , fruit moyen, très bon pour la table et les confitures.	Août
— violette , fruit moyen, violet foncé; très bon.	Mi-sept.
Surpasse Monsieur , fruit très gros, rouge violacé.	Septembre
Washington , fruit très gros, jaune mat et rose; très fertile . . .	Mi-sept.

VIGNES (Vitis)

La Vigne est cultivée sous diverses formes dans nos jardins: cultivée en espalier ou contre-espaliers, elle produit de succulents raisins aux expositions Sud, Sud-Ouest, Est, Sud-Est. L'exposition Nord, trop froide ne lui convient pas. S'accommode de tous les terrains, sauf ceux où l'humidité stagnante règne en permanence; par contre, dans les terres calcaires, schisteuses, pierrees ou siliceuses, les raisins sont abondants et sucrés.

Chasselas de Fontainebleau } En chevelée ou en paniers.
Variétés en collection

Désignation des Variétés

Black Alicante, fruit noir, très gros, octobre.
Boudalès, fruit noir, gros, sucré, octobre.
Chasselas à feuilles laciniées, fruit blanc, moyenne saison.
 — **de Malvoisie**, hâtif, fruit rose, septembre.
 — **Napoléon**, fruit rose, septembre.
 — **Précoce Malingre**, fruit blanc, septembre-octobre.
 — **Royale Rose**, fruit rose, octobre.
 — **Tokai des jardins**, fruit rose clair, septembre-octobre.
 — **Vibert**, fruit, gros ambré, octobre.
 — **violet**, fruit violet, septembre.
Frankental, fruit gros noir, octobre.
Madeleine hâtive, fruit noir, août.
 — **blanche**, fruit blanc, septembre.
Muscat Calliaba, fruit noir, septembre.
 — **d'Alexandrie**, fruit blanc long, octobre.
 — **rouge**, fruit rouge, octobre.
Morillon gris, fruit gris, septembre.
Précoce de Saumur, fruit blanc jaune, septembre.
 — **vert de Madère**, fruit vert doré, septembre.



Chasselas de Fontainebleau.

ARBRES ET ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Ailante Vernis du Japon.	<i>Ailantus glandulosa</i> .
Alisier blanc de Fontainebleau. . .	<i>Crataegus aria</i> .
— du Népal.	— <i>Nepalensis</i> .
— à feuilles luisantes.	— <i>glabra</i> .
Amorpha faux indigo.	<i>Amorpha fruticosa</i> .
Angélique du Japon.	<i>Aralia Japonica</i> .
— épineuse.	— <i>spinosa</i> .
Arbre de Judée rouge.	<i>Cercis silisquatum rubrum</i> .
Argousier rhamnoides.	<i>Hypophæ rhamnoides</i> .
Aulne à feuilles laciniées.	<i>Alnus laciniata</i> .
— blanc.	— <i>incana</i> .
Baguenaudier au séné.	<i>Colutea arborescens</i> .
Bignone catalpa.	<i>Bignonia catalpa</i> .
— — doré.	— — <i>aurea</i> .
— — de Bunge.	— — <i>Bungei</i> .
Couvu aussi sous le nom de <i>Catalpa boule</i> . La tête ronde et régulière de cet arbre en fait un sujet superbe, soit qu'il se trouve isolé, soit qu'il se trouve placé en groupe.	
— — <i>speciosa</i>	— <i>catalpa</i> d'Amérique.
Variété dont le feuillage est très large.	
Bois bouton , céphalante.	<i>Cephalanthus Occidentalis</i> .
Bois joli rouge.	<i>Daphne Mezereum rubrum</i> .
— — blanc.	— — <i>album</i> .
Bonduc ou Chicot du Canada. . . .	<i>Gymnocladus Canadensis</i> .
Bouleau commun.	<i>Betula alba</i> .
— à feuilles laciniées.	— <i>laciniata</i> .
Feuillage tout à fait léger.	
— pourpre.	— <i>purpurea</i> .
— pyramidal.	— <i>pyramidalis</i> .
— à feuilles de peuplier.	— <i>populifolia</i> .
— à papier.	— <i>papyrifera</i> .
Bouleau à canot, feuilles très larges.	
Boule de neige double.	<i>Viburnum opulus sterilis</i> .
— — Carlesi en pot.	— <i>Carlesi</i> .
A fleurs blanc rosé, petite végétation.	
Buddleie de Lindleye.	<i>Buddleia Lindleyana</i> .
— — intermédiaire.	— <i>intermedia</i> .
— — variable.	— <i>variabilis</i> .
Variété nouvelle à végétation rapide, fleurs odorantes en épi élégant, d'une jolie couleur violet rougeâtre.	
Calycanthe de la Floride.	<i>Calycanthus floridus</i> .
— — odorant marabier.	— <i>precox</i> .
Caryopteride	<i>Caryopteris mastacanthus</i> .
Plante d'introduction récente. les tiges sont garnies sur toute leur longueur de panicules de fleurs d'un joli bleu clair, arbrisseau des plus recommandables.	
Ceanothe d'Arnould.	<i>Ceanothus Arnoldi</i> .
— à fleur bleue.	— <i>azureus</i> .
— gloire de Versailles.	— <i>var.</i>
L'une des plus belles parmi les Ceanoths, vigoureuse, grande fleur bleue.	
— Bijou.	— <i>var.</i>
— rose carmin compact.	— <i>roseus carmineus comp.</i>
— Marie Simon.	— <i>var.</i>
Fleur rose, très florifère.	

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Cerisier Sainte-Lucie odorant. . . .	<i>Cerasus Mahaleb</i> .
— — de Virginie.	— <i>padus</i> .
Chalef ou Olivier de Bohême. . . .	<i>Eleagnus angustifolia</i> .
Chamerisier des Alpes.	<i>Chamaecerasus Alpina</i> .
— — de Tartarie.	— <i>Tatarica</i> .
— — de Virginie.	— <i>Virginalis alba</i> .
— — à grande fleur.	— <i>grandiflora</i> .
— — à fleur jaune.	— <i>chrysantha</i> .
— — de Ledebour.	— <i>Ledebourii</i> .
Charme commun.	<i>Carpinus communis</i> .
Charmille pyramidale.	<i>Carpinus pyramidalis</i> .
Cette charmille s'élève en colonnes compactes très jolies.	
Chêne rouge d'Amérique.	<i>Quercus rubra</i> .
— commun.	— <i>robur</i> .
— rouge des marais.	— <i>palustris rubra</i> .
Parmi les Chênes de l'Amérique, c'est une des variétés les plus élégantes et les plus gracieuses.	
— pyramidal.	— <i>pyramidalis</i> .
Arbre d'ornement des plus pittoresques pour jardins paysagers.	
Chionante de Virginie.	<i>Chionanthus virginiana</i> .
Clethra alnifolia.	<i>Clethra alnifolia</i> .
Citronnier à 3 feuilles.	<i>Limonia trifoliata</i> .
Cognassier du Japon.	<i>Cydonia japonica</i> .
Voir poirier du Japon.	
Corchorus du Japon à fl. blanche. .	<i>Corchorus japonica</i> .
— — à fleur double jaune.	— <i>flore pleno</i> .
— — à feuille panachée.	— <i>variegata</i> .
Cornouiller sanguin.	<i>Cornus sanguineus</i> .
— — de Sibérie à feuilles panachées.	— <i>variegata</i> .
Arbuste à feuillage d'une panachure agréable.	
— — de Sibérie.	— <i>Sibirica</i> .
La coloration rouge sang des rameaux plus accentuée que chez le précédent, le rend très intéressant même pendant l'hiver.	
Coronille des jardins.	<i>Coronilla emereus</i> .
Cotoneaster à feuilles étroites. . . .	<i>Cotoneaster angustifolia</i> .
— — de Franchet.	— <i>francheti</i> .
Buissonneux, fruit orangé.	
— — à feuilles de saule.	— <i>salicifolia flocosa</i> .
Espèce très vigoureuse.	
— — des neiges.	— <i>frigida</i> .
A feuillage semi persistant.	
Cytise des Alpes. Faux ébénier. . . .	<i>Cytisus laburnum</i> .
— — à trois feuilles.	— <i>trifolium</i> .
— — Adam.	— <i>Adami</i> .
Desmodium du Japon.	<i>Desmodium japonicum</i> .
Deutzie à feuille rude.	<i>Deutzia scabra</i> .
— — grêle à feuille panachée.	— <i>gracilis variegata</i> .
— — à feuille grêle.	— <i>gracilis</i> .
— — de Fortune à fleur double.	— <i>Fortunei</i> .

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Deutzia à fleur double.	<i>Deutzia crenata candidissima.</i>
— à fleur rose double.	— flore roseo pleno.
— hybride de Lemoine	— hybrida Lemoinei.
A fleurs blanches, extrêmement abondantes mai-juin.	
— à feuilles grêles à fleur rose	— gracilis rosea.
A fleurs blanches, rosées à l'extérieur.	
— marginé de blanc.	— marginata alba.
— feuilles panachées crénelées.	— crenata foliis variegata.
Épine blanche double.	<i>Crataegus flore albo pleno.</i>
— cramoisie double.	— flore coccineo pleno.
La plus belle de toutes les épines connues jusqu'à ce jour.	
— cramoisie simple.	— flore coccineo.
— à feuille panachée.	— foliis variegatis.
— rose double.	— pleno flore roseo.
— à feuille laciniée.	— laciniata.
— linéaire.	— linearis.
— de Naples (Azérolier à gros fruits).	— azerolus.
— Ergot de coq.	— crux galli.
— de Darwin.	<i>Berberis vulgaris Darwini.</i>
Érable de Colchique rouge.	<i>Acer colchicum rubrum.</i>
— marbré.	— striatum.
— de Montpellier.	— MonsPELLIENSIS.
— Négundo à feuille de frêne.	— Negundo
— à fl ^{re} panachée blanc.	— variegata.
Variété à feuilles panachées de blanc, faisant très bon effet sur le fond vert d'une pelouse	
— Négundo à fl ^{re} panach. jaune.	— Negundo variegata.
— sycomore	— pseudoplatanus.
— de Léopold panaché.	— Leopoldii variegata.
Cette variété n'a ses feuilles panachées de blanc.	
— sycomore à feuille pourpre	— purpurea.
— de Reitemback.	— Reitembackii.
Arbre d'une grande vigueur, remarquable par la couleur pourpre de son feuillage ; l'un des plus grands arbres à feuillage pourpre.	
— plane.	— platanoides.
Févier d'Amérique.	<i>Gleditschia triacanthos.</i>
Forsythie à feuille sombre.	<i>Forsythia viridissima.</i>
— à feuille sombre panachée	— viridissima variegata.
— de Fortune.	— Fortunei.
— rampant.	— suspensa.
— de Siebold.	— Sieboldii.
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior.</i>
— à feuilles de Noyer.	— juglantifolia.
— à fleurs.	— ornus.
— pleureur	— pendula.
— argenté.	— argentea.
— à tête ronde en boule.	— globosa.
— hétérophylle	— heterophylla.
— à une feuille.	— monophylla.
— pleureur doré.	— pendula aurea.

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Galé cirier.	<i>Myrica cerifera.</i>
Plante originale se garnissant de baies noires.	
Gattilier commun.	<i>Vitex agnus castus.</i>
Grenadier à fleurs doubles.	<i>Punica granatum fl. pl.</i>
Groseillier doré	<i>Ribes aureum.</i>
— de Gordon	— Gordonianum.
— sanguin	— sanguineum.
Hêtre à feuilles pourpres.	<i>Fagus purpurea.</i>
Ce Hêtre est l'un des plus beaux arbres d'ornement qui existent. Son feuillage noir sombre tranche violemment avec tous les végétaux qui peuvent l'entourer.	
— pleureur	— pendula.
— commun.	— sylvatica.
Hortensia du Japon.	<i>Hortensia japonica.</i>
— à feuilles panachées.	— variegata.
— à fleurs blanches	— alba.
Hydrangea paniculé grandes fl.	<i>Hydrangea paniculata grandiflora.</i>
Idesia à plusieurs fruits.	<i>Idesia polycarpa.</i>
Arbre d'ornement très rustique.	
Indigotier élégant.	<i>Indigofera dosua.</i>
Ketmie des jardins.	<i>Althæa frutex.</i>
— boule de feu.	— var.
— élégante.	— elegantissima.
— à grande fl. superbe.	— superba.
— de Léopold.	— Leopoldii.
— monstreuse.	— monstrosa.
— à fleur de renoncule.	— renonculiflora.
— remarquable rouge.	— speciosa rubra.
— blanche double.	— alba fl. pl.
— toute blanche.	— totus albus.
— Souvenir de C. Breton.	— var.
— à fleur de pivoine.	— pæonœflora.
— Cœlestis.	— var.
Kœlreuteria paniculé.	<i>Kœlreuteria paniculata.</i>
Lespedezie bicolore.	<i>Lespedeza bicolor.</i>
Leycesterie élégante	<i>Leycesteria formosa.</i>
Lilas blanc (simple)	<i>Syringa alba</i>
— Charles X.	— var.
— de Perse.	— Persica.
— du Japon.	— Japonica.
Importé des îles septentrionales du Japon où il forme un arbre qui atteint jusqu'à 10 mètres de hauteur, donnant de grandes fleurs en juillet et août.	
— de Marly rouge (simple), excellent pour le forçage.	
— velu, lilas rosé.	<i>Syringa villosa.</i>
— M ^{me} Casimir Périer (double).	— var.
Fleurs blanc crème.	
— Président Carnot (double)	— var.
Lilas pâle blanc au centre.	
— Souvenir de Louis Spath (simple)	— var.
A larges fleurs pourpre violacé un des plus foncés et des plus florifères.	
— Rothomagensis (simple)	— chinensis.
Fleurs violacées bleuâtres dont l'ensemble forme un panache volumineux.	

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Lilas Marie Legrave (simple).	<i>Syringa</i> var.
— Fleurs blanc crème; très bon à forcer.	
— Belle de Nancy (double), rose satiné.	
— Charles Joly (double), rouge noirâtre.	
— Jeanne d'Arc (double), blanc pur.	
— La Tour d'Auvergne (double), violet pourpre.	
— Madame Abel Chatenay (double), blanc pur.	
— Madame Lemoine (double), blanc pur.	
— Maurice de Vilmorin (double), azuré bleuâtre.	
— Michel Buchner (double), lilas clair.	
— Président Loubet (double), blanc pur.	
Liquidambar copal.	<i>Liquidambar styraciflua</i> .
Maclure épineux.	<i>Maclura aurantiaca</i> .
Magnolier parasol.	<i>Magnolia tripetala</i> .
— de Soulange.	— <i>Soulangiana</i> .
— Yulan.	— <i>conspicua</i> .
— à fleur pourpre.	— <i>purpurea</i> .
Marronnier d'Inde.	<i>Æsculus hippocastanum</i> .
— à fleur double.	— <i>flore pleno</i> .
— — jaune.	— <i>pavia lutea</i> .
— glabre.	— <i>glabra</i> .
— ou pavia à épis.	— <i>macrostachya</i> .
Merisier commun.	<i>Cerasus avium</i> .
— à fleurs doubles.	— <i>flore pleno</i> .
— à grappes.	— <i>padus</i> .
Micocoulier de Provence.	<i>Celtis australis</i> .
— d'Occident.	— <i>occidentalis</i> .
Millepertuis à odeur de bouc.	<i>Hypericum hyrcinum</i> .
— de Moser.	— <i>Moserianum</i> .
— élevé.	— <i>patulum</i> .
Murier blanc.	<i>Morus alba</i> .
— à papier.	<i>Broussonetia papyrifera</i> .
— de Kempfer.	— <i>Kämpferii</i> .
Neviusa de l'Alabama.	<i>Neviusa alabamensis</i> .
— Arbuste de l'État de l'Alabama, très florifère.	
Noyer d'Amérique.	<i>Juglans nigra</i> .
Nuttalia cerasiforme.	<i>Nuttalia cerasiformis</i> .
— Cet arbrisseau produit des baies semblables à des cerises.	
Orme commun.	<i>Ulmus campestris</i> .
— à larges feuilles.	— <i>latifolia</i> .
— feuille pourpre.	— <i>purpurea</i> .
— pyramidal nouveau.	— <i>pyramidalis speciosa</i> .
— Parasol.	— <i>umbraculifera</i> .
— Arbre à tête ronde et compacte. Variété très distincte des autres.	
— tortillard.	— <i>tortuosa</i> .
— Variété des plus vigoureuses.	
— Nous ne saurions trop engager à planter des sujets de cette variété, très appréciée par l'industrie, et qu'aucune autre nature de bois ne peut remplacer.	
— à 3 feuilles de Samarie.	<i>Ptelea trifoliata</i> .
Paulownia impérial d'Amérique.	<i>Paulownia imperialis</i> .

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Peuplier de Van Geert doré.	<i>Populus Van Geerti aurea</i> .
— d'Italie.	— <i>fastigiata pyramidalis</i> .
— du lac Ontario.	— <i>Otariensis</i> .
— neige ou blanc de Hollande.	— <i>nivea</i> .
— pleureur d'Athènes.	— <i>pendula græca</i> .
— Bolleana pyramidal.	— <i>Bolleana</i> .
— Aussi pyramidal que le Peuplier d'Italie, avec cette différence que le feuillage est argenté.	
— (Arbre magnifique pour avenue).	
— beaumier.	— <i>balsamea</i> .
— certinensis.	— <i>certinensis</i> .
— Peuplier asiatique, nouvellement introduit.	
— grisard.	— <i>Canescens</i> .
— de la Caroline.	— <i>Caroliniana</i> .
— Régénéré, à végétation rapide. Voir aussi aux arbres d'alignement.	
Pivoine en arbre (Moutan).	<i>Pæonia arborea</i> .
— Empereur Alexandre.	— —
— Zénobia.	— —
— Cabienski.	— —
— Reine Elisabeth.	— —
— Jules Pierlat.	— —
— Van der Maëls.	— —
— Louise Mouchelet.	— —
— Triomphe de Van der Maëls.	— —
— double odorante.	— <i>odorata plenissima</i> .
Plaqueminier d'Italie.	<i>Diospyros lotus</i> .
Platane à larges feuilles.	<i>Platanus Orientalis</i> .
— pyramidal.	— <i>pyramidalis</i> .
Poirier du Japon, à fleur rouge.	<i>Cydonia japonica rubra</i> .
— — à fleur blanche.	— — <i>alba plenissima</i> .
— double.	— —
— — à grandes fleurs.	— <i>grandiflora</i> .
Pommier à fleurs doubles.	<i>Malus spectabilis</i> .
— de Sibérie.	— <i>baccata</i> .
— ka do.	— <i>var.</i>
— à fleur panachée.	— <i>variegata</i> .
— très florifère.	— <i>floribunda</i> .
— à très gros fruits.	— <i>macrocarpa</i> .
— Variété aussi recommandable pour les fleurs que pour les fruits.	
Potentille en arbre.	<i>Potentilla fruticosa</i> .
Prunier triloba.	<i>Prunus triloba</i> .
— à feuilles pourpres.	— <i>pissardii</i> .
— Arbuste à feuilles et à bois noirs.	
— de Chine à fl. bl. double.	— <i>sinensis alba plena</i> .
— — à fleur rose double.	— <i>rosea plena</i> .
— Ce prunier forme des touffes très jolies au printemps.	
Réglisse officinale.	<i>Glycyrrhiza glabra</i> .
Robinier Pseudo-Acacia.	<i>Acacia commun</i> .
— de Besson.	— <i>Bessoniana</i> .
— Arbre d'un très beau port, feuillage foncé et compact; c'est le plus beau du genre comme arbre d'alignement et le plus résistant au vent.	

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Robinier de Sibérie.	<i>Acacia caragana.</i>
— de Decaisne.	— <i>Decaisneana.</i>
Variété à fleurs très grandes et d'un beau rose.	
— boule.	— <i>inermis.</i>
— à fleurs roses	— <i>rosea.</i>
— toujours fleuri.	— <i>semperflorens.</i>
Cette variété est constamment en fleur depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre.	
— du Mexique.	— <i>neo-mexicana.</i>
Nouveauté, sujet remarquable, vigoureux et rustique, donne en grande abondance des fleurs rose violacé.	
— pyramidal.	— <i>pyramidalis.</i>
Variété aussi pyramidale que le Peuplier d'Italie, formant une magnifique colonne de feuillage, l'une des plus belles variétés d' <i>Acacia</i> .	
— visqueux.	— <i>viscosa.</i>
Romarin officinal.	<i>Rosmarinum officinale.</i>
Saule pleureur	<i>Salix Babylonica.</i>
— à bois bleu.	— <i>cærulea.</i>
— du Japon	— <i>Japonica.</i>
— pleureur noir d'Amérique.	— <i>pendula nigra americana.</i>
— Marsault pleureur.	— <i>caprea pendula.</i>
— pleureur argenté.	— <i>argenta.</i>
Seneçon en arbre.	<i>Baccharis halimifolia.</i>



Robinia (Acacia) neo-mexicana.

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Seringat à fleur d'oeillet double . . .	<i>Philadelphus dianthæflorus.</i>
— — jaune.	— <i>aurea.</i>
— à grande fleur.	— <i>grandiflora.</i>
— inodore.	— <i>inodorus.</i>
— Keteler à fleur double.	— <i>Ketelerii flore pleno.</i>
— à fleur de primevère.	— <i>primulæflora.</i>
— du Népal à file panachée.	— <i>nepalensis variegata.</i>
— odorant	— <i>Coronarius.</i>
Sophora du Japon.	<i>Sophora Japonica.</i>
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia.</i>
— hybride de Laponie.	— <i>hybrida.</i>
— d'Amérique	— <i>Americana.</i>
Spirée à feuilles d'aria.	<i>Spiræ auriculata.</i>
— argentée.	— <i>argentea.</i>
— de Billard.	— <i>Billardii.</i>
— lobata rubra.	— <i>lobata rubra.</i>
— de Fortune blanche.	— <i>callosa alba.</i>
— de Douglas à fleur rose.	— <i>Douglasi rosea.</i>
— de Fontenay —	— <i>Fontanesi rosea.</i>
— à gr. feuilles.	— <i>macrophylla.</i>
— blumei vel eximia.	— <i>blumei vel eximia.</i>
— à fleurs superbes.	— <i>callosa superba.</i>
— à feuilles lancéolées.	— <i>lanceolata.</i>
— de Lindleye.	— <i>Lindleyana.</i>
— à feuilles de viorne	— <i>opulifolia.</i>
— de Reever à fl. double.	— <i>Reeversiana flore pleno.</i>
— toujours fleurie.	— <i>semperflorens.</i>
— de Thunberg.	— <i>Thunbergii.</i>
— bumalda.	— <i>bumalda.</i>
Feuillage blanc rosé et vert, fleurs roses de juin à septembre, très bel effet en bordure.	
— Van Houtte	— <i>Van Houttei.</i>
L'arbuste tout entier se couvre en mai-juin de petits bouquets de fleurs blanches disséminées sur les branches grêles et gracieusement arquées; une des meilleures Spirées.	
Staphylea faux pistachier.	<i>Staphylea pennata.</i>
Stephanandre flexible.	<i>Stephanandra flexuosa.</i>
Cette plante pleure d'une façon gracieuse, les feuilles en sont très découpées.	
— tanakae	— <i>tanakae.</i>
Introduit du Japon, plante à végétation horizontale, feuilles larges prenant à l'automne des teintes très différentes.	
Sumac pourpre.	<i>Rhus atropurpureus.</i>
A houppe pourpre; arbuste très ornemental.	
— des corroyeurs.	— <i>coriara.</i>
— fustet.	— <i>cotinus.</i>
— glabre à feuille laciniée.	— <i>glaber laciniata.</i>
Sureau du Canada panaché.	<i>Sambucus variegata.</i>
— fruits rouges plumeux.	— <i>racemosa plumosa.</i>
— à feuilles laciniées.	— <i>laciniata.</i>
— poudré panaché.	— <i>pulverulenta variegata.</i>

Arbres et Arbustes à feuilles caduques (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Sureau doré	<i>Sambucus aurea</i> .
— pyramidal	— <i>pyramidalis</i> .
Très bonne plante à isoler sur une pelouse.	
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos fructu albo</i> .
— à fruits rouges	— — <i>rubro</i> .
— de Philomèle	<i>Xilosteum Philomelæ</i> .
— à f. panachées	— <i>variegata</i> .
Tamarix d'Alger	<i>Tamarix Africana</i> .
— de France	— <i>Gallica</i> .
— de l'Inde	— <i>Indica</i> .
— du Japon	— <i>Japonica plumosa</i> .
— d'été	— <i>estivalis</i> .
Variété très vigoureuse rose vif, floraison de juillet à septembre.	
Tilleul de Hollande	<i>Tilia platiphyllus</i> .
— à feuilles argentées	— <i>argentæ</i> .
— à feuilles laciniées	— <i>asplenifolia speciosa</i> .
— à larges feuilles	— <i>macrophylla</i> .
— pyramidal	— <i>pyramidalis</i> .
— remarquable pleureur	— <i>spectabilis pendula</i> .
Tulipier de Virginie	<i>Liriodendron tulipifera</i> .
Viorne Mansienne	<i>Virburnum lantana</i> .
— à feuilles de poirier	— <i>pyrifolium</i> .
Virgilier à bois jaune	<i>Virgilia lutea</i> .
Weigélia aimable	<i>Weigelia amabilis</i> .
— Abel Carrière	— — <i>var.</i>
— caméléon	— <i>cameleon</i> .
— blanc	— <i>candida</i> .
— à grande fleur	— <i>gigantæflora</i> .
— à fleur rouge	— <i>hortensirubra</i> .
— M ^{me} Lemoine	— <i>Lemoinei</i> .
— à fleur rose	— <i>rosea</i> .
— Lavallée	— <i>Lavallei</i> .
Très belle variété à fleurs rouges.	
— à feuilles dorées	— <i>variegata aurea</i> .
— de Desbois	— <i>Desboisii</i> .
Xanthoceras à feuille de Sorbier	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> .
Bel arbuste de la Chine centrale à feuillage composé, il donne en mai, en même temps que les feuilles, de jolies fleurs blanches maculées de rouge, cuivré à la base, disposées en grappes de 0 ^m 20 de longueur, très florifère dès son jeune âge.	

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEINE TERRE
à feuilles persistantes

☞ Toutes ces plantes ont été contre-plantées ou élevées en pot.


DÉSIGNATION	NOMS BOTANIQUES
Abelia <i>ruprestis hybrida</i>	<i>Abelia chinensis</i> .
Arbuste à petites feuilles oblongues, demi-persistantes, fleurs petites, blanc rosé, parfumées, à pétales foliacés teintés de rouge très rustique.	
Alaterne toujours verte	<i>Rhamnus alaternus</i> .
Andromède du Japon	<i>Andromeda Japonica</i> .
Variété extrêmement rustique, à feuillage persistant. Se couvre complètement de boutons durant l'hiver, qui épanouissent en février et mars.	
Arbousier des Pyrénées	<i>Arbutus unedo</i> .
Aucuba du Japon	<i>Aucuba Japonica</i> .
— bicolore mâle	— <i>bicolor mascula</i> .
— à longues feuilles femelle	— <i>longifolia fœmina</i> .
— à larges feuilles mâle	— <i>macrophylla mascula</i> .
— maculé mâle	— <i>maculata mascula</i> .
— vert femelle	— <i>viridis fœmina</i> .
Variété se portant très facilement à graines.	
Berberis sténophylle	<i>Berberis stenophylla</i> .
— à fruits doux	— <i>dulcis</i> .
Variété très vigoureuse.	
Buplèvre oreille de lièvre	<i>Bupleurum fruticosum</i> .
Buis en arbre	<i>Buxus rotundifolia</i> .
— de Mahon	— <i>Balearica</i> .
— élégant panaché	— <i>elegantissima variegata</i> .
— doré du Japon	— <i>Japonica aurea</i> .
— pyramidal panaché	— <i>pyramidalis variegata</i> .
— à longues feuilles	— <i>longifolia</i> .
— fin d'Artois	— <i>suffruticosa</i> .
Il existe dans ces variétés des sujets élevés en tiges, taillés en boule produisant un effet très décoratif.	
Buisson de Lalande	<i>Cratægus Lalandii</i> .
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i> .
— liège	— <i>suber</i> .
Cotoneaster à feuilles de Buis	<i>Cotoneaster buxifolia</i> .
— — de Thym	— <i>thymifolia</i> .
— de Simon	— <i>Simonsi</i> .
Elæagnus comestible ou Goumi du Japon	<i>Elæagnus edulis</i> .
Arbuste charmant se couvrant au printemps de fleurs très odorantes, les fruits deviennent rouge vif en juin et juillet, sont excellents pour distiller, et à l'occasion faire des confitures.	
Les faisans et les perdrix en sont très friands, il peut donc être utilisé avantageusement pour établir des couverts à gibier.	
Cet arbuste est rustique et s'accommode de tous les terrains.	
— <i>reflexa</i>	— <i>reflexa</i> .
Arbuste dont les branches sont arquées, les feuilles sont bronzées en dessous.	

Arbustes et Arbrisseaux de pleine terre à feuilles persistantes (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIKES
Elæagnus Simonii	<i>Elæagnus reflexa</i> Simonii.
Variété du reflexa, rameaux moins réfléchis, feuilles argentées dessous.	
Filaria à petites feuilles.	<i>Phillyræa angustifolia</i> .
— à feuilles de laurier.	— <i>laurifolia</i> decora.
— à larges feuilles.	— <i>latifolia</i> .
— de Vilmorin.	— <i>Vilmoreana</i> .
Feuille plus grande que celle des autres variétés rappelant celles du laurier, fleurs blanches odorantes en avril, le plus beau du genre.	
Les <i>Filarias</i> de même que les <i>Osmanthes</i> sont de très jolis arbustes, leur développement trop lent, ne leur a pas encore permis d'être répandus comme ils le méritent.	
Fragon piquant ou houx frelon . . .	<i>Ruscus aculeatus</i> .
— ou laurier d'Alexandrie. . .	— <i>racemosus</i> .
Fusain argenté du Japon.	<i>Evonymus argentea</i> .
— vert.	— <i>japonicus</i> .
— duc d'Anjou.	— <i>japonicus</i> var.
Variété maculée de jaune et d'une grande vigueur	
— à feuilles marginées de blanc.	— <i>marginata argentea latifolia</i>
— brodé d'or.	— <i>latifolia aurea</i> .
— à larges feuilles.	— <i>macrophylla</i> .
— à feuilles ovales panachées. .	— <i>ovata aurea marginata</i> .
— pyramidal toujours vert. .	— <i>pyramidalis sempervirens</i> .
— rampant panaché.	— <i>radicans foliis argenteis</i> .
— — vert.	— <i>radicans viridis</i> .
— élégant.	— <i>pulchellus</i> .
Genêt d'André	<i>Genista Andreana</i> .
Variété nouvelle du Genêt des bois, très vigoureux et très rustique; en mai et juin, la plante se couvre de guirlandes de fleurs à pétales rouge cramoisi et veloutés.	
— d'Espagne	— <i>juncea</i> .
— blanc	— <i>alba</i> .
— des teinturiers.	— <i>tinctoria</i> .
Houx commun.	<i>Ilex aquifolium</i> .
— vert.	— 0m60 à 0m80.
— —	— 0m90 à 1m20.
— —	— 1m30 à 2m.
— de Mahon panaché.	<i>Ilex</i> var.
— à feuilles de camélia.	—
— compact à feuilles dorés. . . .	—
— à feuilles épaisses.	—
— hétérophylle à fruits jaunes. .	—
— du Japon.	—
— de Madère panaché.	—
— à feuilles retournées.	—
— Madame Briot	—
Variété dorée.	
— à feuilles en scie.	—
— panaché de blanc.	—
— de Versailles panaché.	—
— Waterer.	—

Arbustes et Arbrisseaux de pleine terre à feuilles persistantes (Suite)

DÉSIGNATION	NOMS BOTANIKES
Kalmia à larges feuilles.	<i>Kalmia latifolia</i> .
Laurier amande.	<i>Laurus laurocerasus</i> .
— du Caucase.	— <i>Caucasica</i> .
La plus rustique des variétés, feuilles d'un vert foncé.	
— à feuilles rondes.	— <i>rotundifolia</i> .
Feuilles très grandes et très larges.	
— de Bernard.	— <i>Bernadii</i> .
— de Colchique.	— <i>colchica</i> .
— à larges feuilles de Bertin. .	— <i>latifolia Bertinii</i> .
— de Portugal.	— <i>Lusitanica</i> .
— — pyramidal.	— <i>pyramidalis</i> .
Ce Laurier s'élève en pyramide touffue d'un très joli effet.	
— Apollon ou sauce.	— <i>nobilis</i> .
— tin.	<i>Viburnum tinus</i> .
Lavande vraie.	<i>Lavandula vera</i> .
Plante aromatique.	
Magnolia à grandes fleurs.	<i>Magnolia grandiflora</i> .
Mahonia à feuille de houx	<i>Mahonia aquifolium</i> .
— fasciculé.	— <i>fascicularis</i> .
— du Japon.	— <i>japonica</i> .
Millepertuis à grandes fleurs. . . .	<i>Hypericum calycinum</i> .
Olearia haasti.	
Fleurs blanches très abondantes, août-septembre.	
Osmanthe à feuilles de houx. . . .	<i>Osmanthus aquifolius</i> .
— — panachée.	— <i>aquifolius variegata aurea</i> .
Phlomis fruticosa.	<i>Phlomis frutescent</i> .
Troène de la Californie.	<i>Ligustrum Californicum</i> .
— du Japon.	— <i>japonicum</i> .
— à feuilles marginées de blanc.	— <i>argenteum marginatum</i> .
— à feuilles épaisses.	— <i>coriaceum</i> .
— nain de la Chine.	— <i>sinense nanum</i> .
— à trois couleurs.	— <i>tricolor</i> .
— à forme élevée.	— <i>excelsum</i> .
— d'Italie.	— <i>italicum</i> .
— de la rivière Amour.	— <i>Amurense</i> .
— à larges feuilles.	— <i>latifolium</i> .
— commun.	— <i>vulgare</i> .
Viorne rithyodophyllum	<i>Viburnum rithyodophyllum</i> .
Yucca superbe.	<i>Yucca gloriosa</i> .
— pendant.	— <i>pendula</i> .
— glaucescent.	— <i>glaucescens</i> .
— à feuilles étroites.	— <i>angustifolia</i> .
Plantes pittoresques rappelant par leur végétation la flore des pays chauds.	



Cupressus Lawsoniana sticta viridis.

CONIFÈRES

NOMS BOTANIQUES

NOMS VULGAIRES

Abies alba	Sapinette blanche.
— cœrulea	— bleue.
— Alcokiana	Sapin de Alcock.
— amabilis	— aimable.
— balsamea	Baumier de Gilead.
— Canadensis	Hemlock spruce (Canada).
— — sargenti pendula .	Sapin pleureur de Sargent.
— Cephalonica	— de Céphalonie.
— concolor	— concolore.
— Douglasii	— de Douglas.
Arbre originaire de la Californie, de première grandeur et d'une végétation rapide, formant une pyramide d'un très bel effet, tranchant avec la couleur sombre en général des conifères.	
— excelsa	— epicea.
— — aurea	— — à feuilles dorées.
— — monstrosa	— — monstrueux.
— Gordoniana	— Gordon grandis de Vancouver.
— cœrulea Hudsoniensis	— bleu de la baie d'Hudson.
Ce conifère, récemment importé de l'Amérique septentrionale, produit un très bel effet dans les jardins paysagers par la couleur glauque de son feuillage.	
— — inverta	— picea pleureur.
Arbre d'un aspect des plus bizarres, malheureusement encore trop peu connu et répandu.	
— — Maxwelli	— picea de Maxwell.
— — pyramidalis	— — pyramidal.
Ce Sapin s'élève pyramidalement comme le peuplier d'Italie	
— lasiocarpa	— élancé.
— Mariesii	— de Maries.
— Menziesii	— de Menziès.
— Morinda	— de l'Inde.
— nigra Doumetii	— noir de Doumet.
— nobilis	— noble
— — glauca	— — à feuilles glauques.
Cette variété de Sapin est certainement l'une des plus belles courmes jusqu'à ce jour; sa couleur, d'un bleu rare parmi ceux de son espèce, ainsi que la façon dont il jette horizontalement ses branches, le recommandent particulièrement à tous les amateurs.	
— Nordmanniana	— de Nordmann.
Originaire de Crimée, s'élevant à une très grande hauteur en formant une pyramide des plus majestueuses, d'une régularité parfaite, avec une base considérable.	
— Orientalis	— de Trébizonde.
— Panachaica	— de Panachaïe.
— parryana	— glauca de greffe.
— pectinata	— de Normandie.
— Pinsapo	— Pinsapo d'Espagne.
— polita	— élégant.
— subalpina	— subalpin.

L'Épicea est un des arbres les plus beaux qui existent; ses variétés sont très distinctes les unes des autres et, en outre, peu difficiles sur la nature du terrain.

Araucaria imbricata **Araucaria** à feuilles imbriquées

Conifères (Suite)

NOMS BOTANIQUES

NOMS VULGAIRES

Cedrus Atlantica argentea.	Cèdre argenté de l'Atlas.
— — cinerescens	— de l'Atlas cendré.
— — fastigiata	— — pyramidal.
Arbre remarquable, formant une pyramide étroite et bien garnie.	
— — glauca	— à f. glauques.
— deodara	— de l'Inde.
Très belle variété à propager, feuillage glauque de toute beauté, avec ses rameaux pendants, produit d'agréables effets dans le paysage; arbres des plus décoratifs pour l'ornementation des parcs et jardins.	



Cedrus deodara.

Conifères (Suite)

NOMS BOTANIQUES

NOMS VULGAIRES

Cedrus deodara variegata.	Cèdre de l'Inde à f. panachées.
— — robusta	— — robuste.
— — verticillata glauca.	— à feuilles verticillées.
— Libani.	— du Liban.
Cephalotaxus drupacea	Cephalotaxus drupacé.
— Fortunei.	— de Fortune.
Chamæcyparis atrovirens.	Chamæcyparis vert foncé.
— thuyoides.	— faux Thuya.
— spheroida aurea.	— à feuilles dorées.
Cryptomeria Japonica	Cryptomeria du Japon.
Conifère très rustique et bizarre, produisant un très bel effet, soit isolé, soit groupé.	
— ericoides.	— à feuille de bruyère.
Cupressus filiformis elegans.	Cyprés filiforme élégant.
— funebris	— funèbre.
— Lambertiana macrocarpa.	— de Lambert à gros fruits.
— Lawsoniana.	— de Lawson.
La beauté, l'élégance, ainsi que la rusticité de cette variété, la placent au premier rang parmi tous les Cupressus.	
— — argentea.	— de Lawson argenté.
— — elegantissima.	— — élégant.
— — filifera.	— — pleureur.
— — minima glauca.	— — nain à f. glauques.
— — nana argentea.	— — nain argenté.
— — variegata.	— — panaché.
— — stricta cœrulea.	— — pyramidal bleu.
Ce Cyprés s'élève en colonne, contrairement à la plupart des Cupressus.	
— — viridis.	— de Lawson pyram. vert.
Jolie variété trop peu connue, formant une pyramide régulière et compacte, d'un vert foncé l'été et d'un beau vert tendre l'hiver. Sa conformation en fait certainement l'une des plus belles plantes qu'il soit possible de voir. Isolée ou groupée, cette espèce sera toujours destinée à produire l'effet le plus charmant.	
— — variegata alba.	— de Lawson, pan. de blanc.
— — Westermani.	— — de Westerman.
— sempervirens pyramidalis.	— pyramidal toujours vert.
Ginkgo Biloba (Arbre aux 40 écus).	Genévrier à deux lobes.
Arbre d'apparence singulière par son feuillage.	
Juniperus Bermudiana	Genévrier des îles Bermudes.
Ce Genévrier, rapporté du nord-ouest de l'Atlantique, paraît être aujourd'hui acclimaté entre tous les Juniperus, c'est une des variétés les plus originales.	
— communis.	— commun.
— cupressif foliis variegatis.	— sabine à feuil. panach.
— drupacea.	— drupacé.
Ce Juniperus, qui est très rustique, forme une pyramide charmante tranchant fortement avec les autres variétés par la largeur de ses feuilles ainsi que par son coloris.	
— excelsa stricta.	— élevé pyramidal.
— — vera	— — vrai.
— — femina.	— sabine femelle.
— fragans	— odoriférant.
Plante d'une beauté exceptionnelle, parfaitement rustique, charmante variété au feuillage tout argenté.	

Conifères (Suite)

NOMS BOTANIQUES	NOMS VULGAIRES
Juniperus <i>hibernica</i>	Genévrier d'Irlande.
Forme de jolies pyramides très touffues, qui prennent un reflet bleuâtre en l'hiver.	
— <i>Japonica</i>	— du Japon.
— — <i>aurea</i>	— — doré.
— — <i>variegata</i>	— — panaché de jaune.
— <i>pendula</i>	— pleureur.
— <i>plumosa argentea</i>	— à feuil. légère argentée.
— <i>prostrata</i>	— couché.
— <i>Reevesiana</i>	— de Reeves.
— <i>repens</i>	— rampant.
— <i>Sinensis aurea</i>	— de la Chine doré.
— — <i>masc.</i>	— — mâle.
— — <i>pendula</i>	— — pleureur.
Espèce magnifique, appelée à jouer un rôle important dans le décor des jardins.	
— <i>tripartita</i>	— divisé.
— <i>Virginiana</i>	— ou Cèdre de Virginie.
— — <i>elegans</i>	— de Virginie élégant.
— — <i>glauca</i>	— à feuilles glauques.
Très indifférents sur la nature du sol, les <i>Juniperus</i> prospèrent partout; leur rusticité est un de leurs avantages sur les autres conifères.	
Larix <i>Europea</i>	Mélèze d'Europe.
Libocedrus <i>Chiliensis</i>	Libocèdre du Chili.
— — <i>viridis</i>	— — vert.
Pinus <i>Austriaca nigra</i>	Pin noir d'Autriche.
— <i>Bolanderii</i>	— de Bolander.
— <i>cembra</i>	— cembro.
Ce Pin a l'avantage de ne pas se dénuder à la base; c'est une des plus belles variétés.	
— <i>excelsa</i>	— pleureur de l'Himalaya.
Arbre très remarquable sous tous les rapports.	
— <i>insignis</i>	— remarquable.
— <i>Laricio Corsica</i>	— <i>Laricio</i> de Corse.
— <i>pinæa</i>	— pignon.
— <i>Sabiniana</i>	— de Sabine.
— <i>sylvestris</i>	— sylvestre
— — <i>globosa</i>	— — globe.
— <i>strobilus</i>	— de lord Weymouth.
Pin aussi vigoureux que le Pin sylvestre.	
— <i>umbraculifera</i>	— parasol.
Variété naine formant une boule très originale.	
Prumnopitys <i>elegans</i>	Prumnopitys élégant.
Arbre rappelant l'If par son feuillage.	
Retinospora <i>ericoides</i>	Retinospora à feuilles de bruyère.
Cet arbre pousse comme le <i>Thuya aurea</i> , c'est-à-dire en boule compacte.	
— <i>filicoides</i>	— à feuilles de fougère.
— <i>filifera</i>	— pleureur.
— <i>leptoclada</i>	— à feuilles grêles.
— <i>lycopodioides</i>	— — de lycopode.
— <i>obtusa nana</i>	— obtus nain.
— <i>pisifera aurea</i>	— à feuilles dorées.
— — <i>lutescens</i>	— résineux à feuilles jaunes.

Conifères (Suite)

NOMS BOTANIQUES	NOMS VULGAIRES
Retinospora <i>plumosa</i>	Retinospora à feuilles légères.
— — <i>aurea</i>	— — — dorées.
— <i>squarrosa Veitchii</i>	— — écailleux à feuilles glauques.
L'une des variétés les plus jolies.	
— <i>thuyoides</i>	— — en forme de thuya.
Les <i>retinospora</i> préfèrent en général un sol léger à tout autre sol.	
Taxodium <i>dystichum</i>	Cyprès chauve.
— — <i>sempervirens</i>	— — toujours vert.
Taxus <i>adpressa</i>	If à feuilles pressées.
— <i>adpressa stricta</i>	— pyramidal à feuilles pressées
— <i>baccata</i>	— commun.
— <i>Cheshuntensis</i>	— de Cheshunt.
— <i>Dovastoni pendula</i>	— pleureur de Dovaston.
— <i>fastigiata variegata</i>	— pyramidal panaché.
— <i>fructu luteo</i>	— à fruits jaunes.
— <i>Hibernica</i>	— d'Irlande.
Cette variété d'If est l'une des plus belles, elle pousse pyramidalement les branches pressées les unes contre les autres. Isolé par une pelouse, cet If fait très bon effet.	
— <i>variegata</i>	— à feuilles panachées.
— <i>Japonica</i>	— du Japon.
Connu également sous le nom de <i>Podocarpus Coreana</i> , remarquable par la dimension de ses feuilles.	
— <i>pendula gracilis</i>	— pleureur grêle.
— <i>pyramidalis</i>	— pyramidal.
— <i>elegans</i>	— panaché élégant.
— <i>Washingtonii</i>	— de Washington.
D'une reprise facile, les Ifs se plaisent en outre dans tous les terrains	
Thuya <i>gigantea</i>	Thuya gigantesque.
De tous les thuyas, cette variété est celle qui parvient à la plus grande hauteur; on peut avec cette plante former des groupes magnifiques.	
— <i>Lobbii</i>	— de Lobb.
— — <i>atrovirens</i>	— — vert foncé.
— — <i>gracilis</i>	— — grêle.
— — <i>semper aurea</i>	— — toujours doré.
— <i>Occidentalis</i>	— du Canada.
Le plus vigoureux et le plus résistant des thuyas: il sert dans certains endroits à former des haies vives très compactes.	
— — <i>Hoveyii</i>	— — de Hovey.
— — <i>lutea</i>	— — à feuilles dorées.
— — <i>Boothii</i>	— — de Booth.
— — <i>Caucasica</i>	— — du Caucase.
Forme une pyramide conique à base très large dont les branches sont serrées étroitement.	
— — <i>Elvangeriana</i>	— — Tom pousse.
— — <i>globosa</i>	— — globe.
— — <i>pendula</i>	— — pendant.
— — <i>pygmea</i>	— — pygmée.
— — <i>pyramidalis</i>	— du Canada pyramidal.
<i>Thuya</i> s'élève pyramidalement contrairement à la façon de pousser de tous les autres Thuyas.	
— — <i>Vervæneana</i>	— de Vervæne.
Variété dont les feuilles sont jaunes.	

Conifères (Suite)

NOMS BOTANIQUES

Thuja Occidentalis Warreana . . .	Thuja de Warren.
— — Orientalis	— de la Chine.
— — aurea	— nain à pointes dorées.
Espèce formant une boule aussi haute que large, d'une couleur complètement dorée au printemps, faisant très bon effet sur le fond vert d'une pelouse.	
— Dumosa	— nain.
— Orientalis filiformis	— de la Chine, pleureur.
Arbre pittoresque et original.	
— — filiformis erecta	— du Japon, filiforme droit.
— — minima glauca	— nain à feuilles bleues.
— — semper aurea	— toujours doré.
— — variegata aurea	— panaché jaune.
Conifère panaché très vigoureux et d'une superbe apparence.	
Thuyopsis borealis	Thuyopsis boréal.
Bel arbre des régions boréales, d'une vigueur remarquable et d'un aspect pittoresque.	
— borealis compacta	— boréal nain compact.
— — glauca	— à feuilles glauques.
— — pendula	— pleureur.
— — variegata	— panaché.
— dolabrata	— dolabrata.
Conifère de croissance un peu lente mais néanmoins magnifique.	
— — variegata	— panaché.
Torreya grandis	Torreya élevé.
— myristica	— de Californie.
Wellingtonia gigantea	Sequoia gigantesque.
Originaire de la Californie, cet arbre est devenu aujourd'hui l'ornement de nos parcs.	
— — pendula	— pleureur.

Toutes ces plantes sont livrées en tontines ou contre-plantées, suivant la force.

Il existe dans chaque variété des plantes plus fortes
qui seront traitées de gré à gré.

Il sera fait une réduction de prix pour les Conifères communs
pris en quantité.

CHAMÆROPS EXCELSA ou PALMIER

Prix suivant force.



Juniperus hibernica

JEUNES PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

Acacia.
Aulne.
Bouleau.
Charmille.
Châtaignier.
Chêne.
Épine.
Faux ébénier.

Frêne.
Hêtre.
Marsaule.
Noisetier des bois.
Orme.
Tilleul de Hollande.
Tilleul des bois.
Troène.

CONIFÈRES

Sapin ordinaire ou Épicéa.
Pin d'Écosse.

Pin noir d'Autriche.

Tous ces plants ont un, deux ou trois ans de repiquage.

Il existe des plants très forts (petits baliveaux) pour lesquels on pourra traiter de gré à gré.

ARBRES D'ALIGNEMENT

Pour routes et avenues

Acacia commun.
— Bessoniana.
Ailante glanduleux. Vernis du Japon.
Aulne commun.
Bouleau commun.
Catalpa.
Cedrela Sinensis.
Erable Sycomore.
— plane.
Frêne d'Europe.
Marronnier à fleurs blanches.

Marronnier à fleurs rouges.
Orme commun.
— à larges feuilles.
Paulownia.
Peuplier d'Italie.
Platane.
Pterocarya Caucatica.
Sorbier des Oiseleurs.
Tilleul de Hollande.
— argenté.
Vernis du Japon. Voy. Ailante.

Il existe dans chacune de ces variétés des sujets contre-plantés qui seront traités de gré à gré.

ARBRES PLEUREURS

Acacia pleureur.
Frêne pleureur.
— doré pleureur.
Hêtre pleureur.
Mûrier pleureur.
Orme pleureur.
Pêcher pleureur.
Peuplier d'Athènes pleureur.

Pommier pleureur.
Saule argenté.
— de Babylone pleureur.
— noir d'Amérique pleureur.
— de Petzold pleureur.
Sophora pleureur.
Sorbier pleureur.
Tilleul pleureur.

Il existe dans chacune de ces variétés des sujets plus forts qui seront traités de gré à gré.

PEUPLIERS RÉGÉNÉRÉS

PLANTS FORTS (Prix sur demande)

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS

Akebia quinata.
Aristolochie siphon.
Bignonia grandiflora.
— radicans.
Celastrus paniculata.
Chèvrefeuille Lonicera sempervirens
— Flava nova.
A feuilles caduques très glauques dessous; fleurs jaune citron.
— de la Chine.
— Fuchsioïdes.
Cette variété très vigoureuse produit en abondance des fleurs rouges.
— aurea reticulata.
— Belgica.
Très belle variété à fleurs jaunes.
— Halleana blanc.
— Hybridus semperflorens.
Clématite blanche odorante.
— à fleur bleue simple.
— Vitalba.
— Alexandra.
— Impératrice Eugénie.
— bleue double.
— Montana.
— Sophia flore pleno.
— Lady Caroline Newil.
— Rubella.
— Perfecta.
— Lucie Lemoine (blanche double)
— M^{me} Grangé (violettes très belle)
— Insignis.
— Jeanne d'Arc.
— Lanuginosa (foncé).
— Belle d'Orléans.
— Henry.
— Carulea erecta vivace.
Glycine de la Chine bleue (Wistaria).
— — — — à fleur blanche.

Glycine de la Chine à fleur double.
Les fleurs sont violettes et bien pleines.
— Multijuga.
— blanche.
Jasmin blanc.
— jaune uniflora.
— triomphant, très odorant.
— à feuilles panachées.
Lierre d'Irlande.
— à feuilles en cœur.
— panaché élégant petit.
— d'Alger.
— dentata.
Celui des Lierres qui a les plus larges feuilles.
— variegata alba.
— maculata major.
Menispermum canadense.
Polygonum Baldschuanicum.
Plante superbe, haute de 5 m. et plus, se couvrant de fleurs blanc rosé pendant tout l'été. Très rustique sous notre climat.
Rosiers grimpants (voir Rosiers).
Schizophragma hydrangeoides.
Plante grimpante donnant des fleurs semblables à celles de l'Hortensia à grandes fleurs.
Vigne-Vierge. Ampelopsis.
— à feuilles panachées.
— Dissecta.
— Elegantissima variegata.
— Engelmanni.
Plante vigoureuse, s'attachant à la muraille.
— Muralis.
Nouvelle variété à larges feuilles, s'attache naturellement à la muraille.
— Striata sempervirens.
— Veitchii.
Charmante variété à feuillage léger, qui pousse avec la plus grande vigueur et n'a besoin d'aucun treillage pour la soutenir.

ROSIERS (Rosa)

Les Rosiers doivent occuper la plus grande place dans la décoration florale de nos jardins d'agrément. D'une culture facile, peu exigeants sur la nature du terrain et sur l'exposition, on les cultive sous 3 formes : nains, demi-nains et tiges que l'on peut disposer en corbeilles ou plantes-bandes ou en former des groupes du plus bel effet.

Comme les Rosiers sont appelés à vivre plusieurs années sur le même emplacement, il convient de bien préparer le sol par des labours profonds et y incorporer des engrais organiques bien décomposés.

Bien que la plantation des Rosiers puisse se faire pendant toute l'année — si l'on prend des sujets élevés en pots — la meilleure saison pour les sujets cultivés en pleine terre et arrachés en racines nues est de novembre en février-mars pour effectuer la plantation en pleine terre.

Liste des principales Variétés

Je possède en outre une collection très complète et suis à même de fournir toutes bonnes variétés qui ne sont pas comprises dans la liste ci-après.

Tiges.

Demi-Tiges.

Nains.

Francs de pied.
Grimpants



Rosier La France

Rosiers (Suite)

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS

Abel Carrière, cramoisi.
Baron Girod de l'Ain, cramoisi.
Baronne de Rothschild, rose.
Candeur Lyonnaise, blanc pur.
Captain Christy, rose carné.
Commandeur Jules Gravereau, rouge feu.
Duke of Edinburgh, écarlate.
Eclair, rouge.
Empereur du Maroc, pourpre nuancé.
Eugène Fürst, cramoisi velouté.
François Coppée, rouge vif.
Georges Arends, rose.
Général Jacqueminot, rouge velouté.
Gloire de Chedane Guinoiseau, rouge vif.
Gloire Lyonnaise, blanc crème.
Hugh Dickson, cramoisi brillant.

Heinrich Münch, rose.
Her Majesty, rose tendre.
Jean Liabaud, cramoisi nuancé.
Jules Margottin, carmin.
Louis Van Houtte, grenat foncé.
Louise Cretté, blanc crème.
M^{me} Albert Barbier, jaune nuancé abricot.
M^{me} Gabriel Luizet, rose tendre.
Margaret Dickson, blanc clair.
M^{rs} John Laing, rose clair.
Paul Neyron, rose foncé.
Prince Camille de Rohan, cramoisi.
Red Star, rouge feu.
Reine des Neiges, blanc pur.
Ulrich Brunner, cerise brillant.
Vick's Caprice, rose panaché.
Souvenir de la Malmaison, blanc rosé.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉS

Admiral Ward, rouge noirâtre.
Admiration, crème, teinté vermillon.
Aspirant Marcel Rouyer, abricot.
Augustine Guinoiseau, blanc.
Antoine Rivoire, blanc carné fond jaune.
Betty, rose cuivré.
Betty Uprichard, rose saumon cuivré.
Caroline Testout, rose satiné.
Château de Clos-Vougeot, cramoisi écarlate.
Columbia, rose brillant.
Comtesse de Cassagne, rose cuivré.
Covent Garden, cramoisi foncé.
Crimson Emblen, cramoisi brillant.
Dame Edith Helen, rose pur.
Dean Hole, carmin argenté.
Earl Haig, rouge cramoisi foncé.
Edel, blanc.
Edward Mawley, cramoisi velouté.
Eldorado, jaune teinté rouge.
Etoile de France, rouge grenat velouté.
Etoile de Hollande, rouge foncé.
Eugène Bouillet, rouge cramoisi.
Général Mac Arthur, rouge écarlate.

Général Supérieur A. Janssen, rouge carmin.
George C. Waud, écarlate orange.
Georges Dickson, cramoisi écarlate.
Gorgeous, orange cuivré.
Golden Ophelia, jaune abricot.
Gruss an Teplitz, rouge écarlate.
Hadley, rouge cramoisi.
H.-E. Richardson, cramoisi foncé.
Jonkheer J.-L. Mock, rouge clair.
Joseph Hill, rouge saumoné.
J.-B. Clark, écarlate foncé.
John Russell, rouge cramoisi velouté.
Kaiserin Augusta Victoria, blanc.
K. of K., écarlate.
La Champagne, jaune orangé.
La France, rose carné.
La France de 89, rouge vif.
La Tosca, rose tendre.
Lady Ashtown, rose tendre.
Laurent Carle, carmin velouté.
Lieutenant Chauré, rouge cramoisi.
La France Victorieuse, rose argenté carminé.
M^{me} Abel Chatenay, rose nuancé.
M^{me} Butetrily, rose abricot.
M^{me} Jules Bouché, blanc crème.

Rosiers (Suite)**ROSIIERS HYBRIDES DE THÉS (Suite)**

M^{me} Jules Grolez, rose de Chine.
 M^{me} Léon Pain, saumon carné.
 M^{me} Meha Sabatier, cramoiis brillant.
 M^{me} Segond-Weber, rose saumoné.
 Maréchal Lyautey (1931), rouge foncé brillant.
 Margaret Dickson Hamill, jaune paille.
 Mélanie Soupert, jaune carminé.
 Mildred Grant, blanc rosé.
 Mistress Aaron Ward, jaune nuancé saumon.
 Mistress Arthur Robert Waddell, jaune et orange.
 Mistress Henry Morse, rose brillant.
 Noblesse, jaune abricot primevère.
 Ophelia, chair saumoné.
 Président Poincaré, rose vif nuancé jaune.

Prince de Bulgarie, rose cuivré.
 Pharisaer, rose blanchâtre.
 Radiance, rose carminé saumoné.
 Richmond, cramoiis écarlate.
 Sunburst, jaune orangé.
 Souvenir de H.-A. Verschuren, jaune orange.
 Souvenir du Président Carnot, blanc rosé.
 Souvenir du Sergent Cretté, jaune or cuivré.
 Souvenir de Claude Denoyel, rouge cramoiis brillant.
 Toison d'Or, jaune orangé.
 Triumph, carmin foncé.
 Vicomtesse Folkestone, rose saumoné.
 White Killarney, blanc pur.

ROSIIERS THÉS

Etoile de Lyon, jaune vif.
 Franziska Krüger, jaune et rose.
 Général Galliéni, ponceau teinté sang.
 Grace Darling, blanc crème teinté rose.
 Lady Hillington, jaune foncé.
 M^{me} Constant Soupert, jaune teinté rose.
 M^{me} Jean Dupuy, jaune d'or rougeâtre.

Maman Cochet, rose saumon.
 Marie d'Orléans, rose vif.
 Marie Van Houtte, rose et jaune.
 Perle des Jardins, jaune pâle.
 Souvenir de Pierre Notting, jaune d'or.
 Safrano, jaune.
 White Maman Cochet, blanc nuancé.

ROSIIERS PERNETIANAS

Arthur R. Goodwin, orange rougeâtre.
 Angèle Pernet, orange rougeâtre.
 Beauté de Lyon, rouge corail teinté jaune.
 Belle Cuivrée, rouge crevette nuancé jaune.
 Comtesse de Castilleja, orange liséré de vermillon.
 Constance, jaune orange carmin, vermillon.
 Elvira Aramayo, rouge cuivre.
 Georges Clemenceau, orange vif nuancé carmin.
 Golden Emblen, jaune vif.

Indépendance Day, jaune orange.
 Jean C.-N. Forestier, laque carminé capucine.
 Julien Potin, jaune primevère.
 Juliet, rouge rosé et vieil or.
 Los Angelès, feu, rose jaune, saumon.
 Louise-Catherine Breslau, rouge crevette, revers jaune.
 Lyon-Rose, rouge corail saumoné.
 Les Rosati, carmin vif.
 M^{me} Ed. Herriot, rouge corail nuancé rose.
 M^{me} Henri Graveraux, jaune cuivré.
 M^{me} Forest-Calcombet, carmin brillant.

Rosiers (Suite)**ROSIIERS PERNETIANAS (Suite)**

Padre, rouge crevette.
 Président Herbert Hoover, orange brillant, rose vif et cuivré.
 Princesse Marie-José, vermillon orangé.
 Reims, rose carné, ombré feu.
 Rayon d'Or, jaune soleil.
 Soleil d'Or, jaune d'or, rougeâtre.

Souvenir de Claudius Pernet, jaune pur.
 Souvenir de Georges Pernet, rouge d'or carmin.
 Talisman, rouge écarlate et jaune d'or (nouveau).
 Ville de Paris, jaune orangé.
 Willowmère, rouge crevette nuancé jaune.

ROSIIERS POLYANTHAS

Distinction (Joseph Guy), rose.
 Eblouissant, rouge foncé.
 Edith Cavell, rouge foncé.
 Ellen Poulsen, rose foncé.
 Georges Elger, jaune d'or.
 Golden Salmon, saumon doré.
 Gloria Mundi, orange écarlate.
 Jeanne d'Arc, blanc pur.
 Joseph Guy, rouge vif.

La Marne, rose saumoné.
 M^{me} Norbert Levavasseur, rouge pourpre.
 Maréchal Foch, rouge cerise vif.
 M^{rs} W. Cutbush, rose tendre.
 Orléans Rose, rouge teinté rose.
 Paris, rouge vif.
 Paul Crampel, rouge géranium orange.
 Yvonne Rabier, blanc pur.

ROSIIERS GRIMPANTS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Aimée Vibert, blanc.
 Bouquet d'Or, jaune foncé.
 Belle Lyonnaise, jaune crème.
 Céline Forestier, jaune.
 Climbing Caroline Testout, rose.
 — Captain Christy, rose.
 — Claudius Pernet (1932), jaune soleil pur.
 Climbing Etoile de Hollande (nouveau).
 — Général Mac Arthur, rouge écarlate.
 — Hadley, rouge cramoiis.
 — La France, rose.
 — M^{me} Ahel Chatenay, rose nuancé.
 — La France 89, rouge vif.
 — Lady Hillington, orange abricot.
 — Liberty, rouge.
 — M^{me} Aaron Ward, jaune indien.
 Climbing M^{me} Edouard Herriot, rouge corail nuancé.
 — M^{me} Jules Grolez, rose de Chine.
 — Malmaison, blanc rosé.
 — Reine des Neiges, blanc pur.
 — Richmond, cramoiis écarlate.

Duchesse d'Auerstadt, jaune d'or.
 E. Veyrat Hermanos, abricot rosé.
 J.-B. Clark, écarlate foncé.
 Gloire de Dijon, jaune saumoné.
 M^{me} Alfred Carrière, blanc carné.
 M^{me} Bérard, saumon.
 M^{me} Driout, rose vif panaché.
 M^{me} Isaac Péreire, rouge.
 M^{me} Jules Graveraux, jaune chamois.
 Maréchal Niel, jaune vif.
 Noëlla Nahonnand, rouge cramoiis.
 Reine Marie-Henriette, rouge cerise.
 Rêve d'Or, jaune.
 Souvenir de Claudius Desnoy, rouge cramoiis.
 Souvenir de Léonie Viennot, rose pêche capucine.
 Vicomtesse Pierre du Fou, magenta rougeâtre, teinté de jaune.
 William Allen Richardson, or cuivré.
 Zéphirine Drouhin, rose Neyron foncé.

Rosiers (Suite)

ROSIERS GRIMPANTS et PLEUREURS NON REMONTANTS (Wichuraiana)

- | | |
|--|---|
| Albéric Barbier, blanc crème centre jaune. | Lady Godiva, rose chair tendre. |
| Albertine, chamois cuivré, saumon vif. | Lady Gay, rose vif. |
| American Pillar, rose vif brillant. | Léontine Gervais, rouge capucine et saumon. |
| Aviateur Blériot, jaune et or. | Paul Scarlet Climber, écarlate brillant. |
| Coronation, rouge cramoisi brillant. | Petite Odette, rose. |
| Crimson Rambler, cramoisi vif. | Weilchenblau, lilas rose passant au bleu d'acier. |
| Dorothy Perkins, rose tendre. | White Dorothy Perkins, blanc double. |
| Excelsa, rouge écarlate brillant. | |
| Hiawatha, rouge vif, centre jaune. | |
| Jacotte, saumon cuivré et jaune safran. | |

RHODODENDRONS (Rhododendrum)

Parmi les végétaux rustiques de pleine terre, les majestueux Rhododendrons sont les plus beaux arbustes que l'on puisse introduire dans les jardins d'agrément. Plantés en terre de bruyère, ils s'accommodent de toutes les expositions, sauf celle du Midi, car ils redoutent la sécheresse de l'été.

Les meilleures époques de plantation sont : septembre-octobre ou mars-avril.

Suivant les variétés, ils fleurissent d'avril en juin ; on peut les disposer en grappes ou les planter isolément sur les pelouses.

Ils redoutent les sols et les eaux calcaires.

Rhododendrons pontiques ou Sauvageons.

- de greffe, 2 à 3 ans, avec boutons.
- 4 à 5 ans, avec boutons.

Les plantes plus fortes seront traitées de gré à gré.

Liste sur demande.

AZALÉES (Azalea)

Les Azalées de pleine terre à feuilles caduques et celles à feuilles persistantes, sont de superbes arbustes d'ornement à cultiver en terre de bruyère : la beauté et la richesse de leurs coloris des plus variés, les recommandent pour la décoration des plates-bandes exposées au soleil, leur abondante floraison égayera le jardin d'agrément au début du printemps (mars-avril).

Azalée pontique jaune.

- Mollis couleurs variées.

Azalée d'Amérique ou de greffe :

- remarquable, rose à grande fleur.
- unique.
- Maria Verschaffelt, rose tendre.
- Saturna, beau rouge.
- Commetta, jaune pâle.
- Rembrandt, rose tendre.
- Gloriosa, lilas.
- Eclipse, jaune rose.
- Optima.
- Impératrice, jaune clair.
- Pulchella.
- Léonidas.

Azalea Amoena, plante à feuilles persistantes, très jolie et bonne pour forcer.

PLANTES POUR BORDURES

Egopodium podagraria, feuilles panachées produisant un effet charmant très vigoureux.

Buis fin d'Artois.

Deutzia gracilis variegata.

Evonymus radicans variegata.

- pulchellus.

Festuca glauca.

Germandrée (*Teucrium*) petit-chêne.

Iris de Germanie variés (Voir plantes vivaces).

Lierre en dix variétés (Voir plantes grimpantes).

Mignardise, Œillets blancs ou roses.

Pervenche major.

- panachée.

- à fleur rose.

Pyrèthre gazonnant (Voir plantes vivaces).

Stipa pennata.

Thym.

Violettes variées (Voir plantes vivaces)

PLANTES VIVACES

Anémone du Japon, Honorine Jobert, blanche.

- fleurs rouges.

- elegans.

- flore pleno.

Aralia edulis.

Arundo donax ou Bambou de Provence.

- à feuilles rubanées panachées.

Bambou metaké.

- Fortunei variegata. Plante magnifique à feuilles rubanées de blanc.

- noir.

Erianthus Ravennæ.

Eulalia du Japon. Belle graminée à feuilles très étroites et très longues, tiges nombreuses couronnées d'aigrettes.

- Zebrina (Eulalia zébrée).

Festuca glauca. Jolie plante gazonnante pour bordures, poussant dans les terrains les plus arides.

Gynerium argenteum ou plume des Pampas.

- soyeux.

Le plus beau des *Gyneriums*, ses panaches, d'une extrême finesse, se balançant mollement au moindre souffle, donnent une grâce toute particulière à cette plante.


- le roi des rouges.

Hoteia du Japon. Une des plus jolies plantes, pouvant donner de 5 à 6 rameaux à fleurs blanches ou roses.

- variegata.

Superbe plante à feuilles réticulées de jaune, aussi florifère que la précédente.

- à fleurs de pêcher. Fleurs rose tendre.



Gyncrium soyeux (Plume des Pampas).

Plantes vivaces (Suite)

Iris de Germanie en 24 variétés. Fleurs variées et de toutes les nuances.

Phlox vivaces variés.

Pivoine herbacée (officinalis).

- Duchesse de Nemours, blanc pur, odorante.
- Reine Victoria, belle, rose, très double.
- Carnea triomphant, chair.
- Duchesse de Cazes, cramoisie.
- splendida.
- Comte de Paris.
- edulis superba rouge, très odorante.
- purpurea, nouveau.

Pyrèthres variés.

- gazonnant.

Reine des prés. Voy. Hoteia.

Rhubarbe Linneus, Rheum.

- Paragon. Variété ne donnant pas de graines et produisant deux fois plus de pétioles que les autres variétés.
- officinalis.
- Victoria.

Rose de Noël. Hellébore blanc.

- — hybride varié. Coloris roses, rouges et bruns.

Spirea venusta rosea. Panicules d'un beau rose, très gracieux.

- aruncus.

Statice latifolia.

Tritoma uvaria.

- nobilis.

Violette des quatre saisons.

- le Czar.
- de Parme.
- Bleu double.
- Rose double.
- Reine des Violettes.

PLANTES PRÉPARÉES POUR LE FORÇAGE

Lilas de Marly.

Boule de neige. (Viburnum opulus).

DISTANCES AUXQUELLES ON DOIT PLANTER LES ARBRES FRUITIERS

ABRICOTIER

Haute tige ou plein vent, 5 mètres.

Pyramide ou buisson, 3 mètres.

Palmette ordinaire ou éventail, 3 à 4 mètres.

Forme en U, 0 m. 60.

Palmette verrier à 3 branches, 0 m. 90.

— — 4 — 1 m. 20.

— — 5 — 1 m. 50.

— — 7 — 2 m. 10.

CERISIER

Haute tige ou plein vent, 6 à 8 mètres.

Pyramide ou buisson, 4 mètres.

Palmette ordinaire, 3 à 4 mètres.

Palmette verrier à 4 branches, 1 m. 20.

— — 5 — 1 m. 50.

— — 7 — 2 m. 10.

PÊCHER

Palmette ordinaire, 4 mètres.

— verrier à 3 branches, 1 m. 50.

Forme en U, 1 mètre.

Oblique simple, 0 m. 90.

— double, 1 m. 80.

POIRIER

Poirier à cidre, 10 à 12 mètres.

— tige à couteau sur franc, 6 à 8 mètres.

— — sur cognassier, 5 mètres.

Pyramide sur franc, 4 mètres.

— sur cognassier, 3 mètres.

Fuseau, 2 mètres.

Palmette ordinaire ou éventail, 3 mètres.

— verrier à 2 branches, 0 m. 60.

— — 3 — 0 m. 90.

— — 4 — 1 m. 20.

— — 5 — 1 m. 50.

Oblique simple, 0 m. 45.

Cordon vertical, 0 m. 40.

POMMIER

Pommier à cidre, 10 à 12 mètres.

— tige à couteau, 6 à 8 mètres.

Pyramide, 3 mètres.

Fuseau, 2 mètres.

Vase ou gobelet sur doucin, 2 m. 50.

— — sur paradis, 2 mètres.

Forme en V pour losange, 1 mètre.

Palmette ordinaire, 3 mètres.

— verrier, même distance que pour les poiriers.

Cordon vertical, 0 m. 40.

— horizontal à 1 ou 2 bras : sur paradis, à 3 mètres.

PRUNIER

Haute tige ou plein vent, 5 à 6 mètres.

Pyramide, 5 mètres.

Palmette ordinaire, 3 à 4 mètres.

— verrier, mêmes distances que pour les poiriers.

TABLE DES MATIÈRES

Arbres fruitiers

	Pages.		Pages.
Abricotier.	3	Kaki.	10
Amandier.	4	Marronnier.	10
Asperges.	4	Mûrier.	10
Brugnon.	4	Néflier.	10
Cassis.	4	Noisetier.	10
Cerisier.	4	Noyer.	10
Châtaignier.	6	Pêcher.	11
Cognassier.	6	Poirier.	13
Cormier.	6	— à cidre.	19
Cornouiller.	6	Pommier.	22
Figuier.	6	— à cidre.	26
Fraisier.	7	Prunier.	27
Framboisier.	8	Vigne.	29
Groseillier.	8		

Arbres et Arbustes d'ornement
et plantes vivaces

	Pages.		Pages.
Abelia.	39	Arbres pleureurs.	50
Abies.	43	Arbres et arbustes à feuilles ca-	
Acacia.	35, 50	duques.	30
Acer.	32	Arbustes et arbrisseaux à feuilles	
Ægopodium.	57	persistantes.	39
Æsculus.	34	Arbustes sarmenteux et grimpants	51
Ailantus.	30, 50	Arbutus.	39
Akebia.	51	Argousier.	30
Alaterne.	39	Aristoloché.	51
Alisier.	30	Arundo.	57
Alnus.	30	Aucuba.	39
Althæa.	33	Aulne.	30, 50
Amorpha.	30	Azalée.	56
Andromeda.	39	Baccharis.	36
Anémone.	57	Baguenaudier.	30
Angélique.	30	Bambou.	57
Aralia.	30, 57	Berberis.	32, 39
Araucaria.	43	Betula.	30
Arbousier.	39	Bignonia.	30, 50
Arbre de Judée.	30	Bois bouton.	30
Arbres d'alignement.	50	Bois-joli.	30

Table des Matières (Suite)

	Pages.		Pages.
Bonduc.	30	Cydonia.	31 35
Bouleau	30 50	Cypres	45 47
Boule de neige.	30 59	Cytisus.	31
Broussonetia	34	Daphne.	30
Buddleia.	30	Desmodium.	31
Buis	39 57	Deutzia.	31
Buplevrum	39	Diospyros.	35
Buxus	39	Distances de plantation	60
Calycanthus.	30	Eleagnus.	31 39
Carpinus	31	Epine.	32 50
Caryopteris.	30	Erable	32 50
Catalpa.	30 50	Erianthus.	57
Ceanothus.	30	Eulalia.	57
Cedrela.	50	Evonymus	40 57
Cedrus.	44	Fagus.	33
Celastrus	51	Faux ébénier.	50
Celtis.	34	Festuca.	57
Cephalanthus	30	Févier	32
Cephalotaxus	45	Filaria	40
Cerasus.	31 34	Forsythia.	32
Cercis	30	Fragon.	40
Cerisier.	31	Fraxinus	32
Chalef	31	Frêne.	32 50
Chamæcerasus.	31	Fusain	40
Chamæcyparis.	45	Galé	33
Chamærops.	48	Gattilier	33
Charme.	31	Genêt.	40
Charmille.	31 50	Genévrier.	45
Châtaignier.	50	Genista.	40
Chêne	31, 39 50	Germadrée.	57
Chèvrefeuille.	51	Gingko.	45
Chionanthus.	31	Gleditschia	32
Citronnier	31	Glycine.	51
Clématite.	51	Grenadier.	33
Clethra.	31	Grosceillier.	33
Cognassier.	31	Gymnocladus	30
Colutea.	30	Gynierum.	57
Conifères	43	Hêtre	33 50
Corchorus.	31	Hortensia.	33
Cornouiller	31	Hoteia	57
Cornus.	31	Houx	40
Coronilla	31	Hydrangea	33
Cotoneaster.	31 39	Hypericum	34 41
Cratægus.	30, 32 39	Idesia.	33
Cryptomeria.	45	If	47
Cupressus.	45	Ilex	40

Table des Matières (Suite)

	Pages.		Pages.
Indigofera	33	Pervenche.	57
Iris.	57 59	Peuplier.	35 50
Jasminum.	51	Philadelphus.	37
Jeunes plants d'arbres forestiers.	50	Phlomis.	41
Juniperus.	45	Phlox.	59
Kalmia.	41	Pin.	46 50
Ketmie.	33	Pivoine.	35 59
Kœlreuteria.	33	Plantes pour bordures.	57
Larix.	46	Plantes vivaces.	57
Laurier.	41	Plants d'arbres forestiers.	50
Lavandula	41	Plaquemnier	35
Lespedezie	33	Platane.	35 50
Leycesteria	33	Poirier.	35
Libocedrus	46	Polygonum	51
Lierre.	51 57	Pommier	55 50
Ligustrum.	41	Populus.	35
Lilas.	33 59	Potentille.	35
Limonia.	31	Prunnotypis	46
Liquidambar	34	Prunier.	35
Liriodendron	38	Prunus.	35
Maclura.	34	Ptelea	34
Magnolia	34 41	Pterocarya	50
Mahonia	41	Punica	33
Malus.	35	Pyrèthre	57 59
Marronnier	34 50	Quercus.	31 39
Marsaule	50	Régliée.	35
Mélèze	46	Retinospora.	46
Menispermum.	51	Rhamnus.	39
Merisier.	34	Rhododendron.	56
Micocoulier	34	Rhubarbe.	59
Mignardise	57	Rhus.	37
Millepertuis.	34 41	Ribes.	33
Morus.	34	Robinia.	35
Mûrier	34	Romarin	36
Myrica.	33	Rose de Noël.	59
Negundo	32	Rosiers.	52
Neviusa.	34	Rosiers grimpants	55
Noisetier	50	Ruscus.	40
Noyer	34	Salix.	36
Nuttalia.	34	Sambucus.	37
Olearia.	41	Sapin.	43 50
Orme.	34	Sapinette.	43
Osmanthus	41	Saule.	36 50
Pæonia.	35	Schizophragma.	51
Paulownia.	34 50	Senecion	36
Pêcher	50	Sequoia.	48

Table des Matières (Suite)

	Pages.		Pages.
Seringat	37	Thym.	57
Sophora.	37 50	Tilia.	38
Sorbier.	37 50	Tilleul.	38 50
Sorbus.	38	Torreya.	48
Spirea.	37	Tritoma.	59
Staphylea.	37	Troène.	41 50
Statice.	59	Tulipier.	38
Stephanandra.	37	Ulmus.	34
Stipa.	57	Vernis du Japon.	50
Sumac.	37	Viburnum.	30, 38 41, 59
Sureau.	37	Vigne-vierge.	51
Symphoricarpos.	38	Violette.	57 59
Syringa.	33	Virgilia.	38
Tamarix.	38	Vitex.	33
Taxodium.	47	Weigelia.	38
Taxus.	47	Wellingtonia.	48
Thuya.	47	Wistaria.	51
Thuyopsis.	48	Xanthoceras.	38
		Yucca.	41

RÉCOMPENSES

obtenues aux différentes Expositions (Suite)

FRANCEVILLE (Seine-et-Oise).

Exposition Générale. . . Prix d'Honneur. Grande Médaille d'Or.

PONTOISE

Exposition Générale. . . Grand Prix d'Honneur. Médaille d'Or.

MEAUX (Concours Régional de Lizy-sur-Ourcq).

Visite de Culture. Grande Médaille de Vermeil.*Décernée par la Société d'Agriculture de l'Arrondissement pour
PLANTATIONS FRUITIÈRES les mieux comprises.*

VERVINS (Aisne).

Congrès Pomologique. Grande Médaille de Vermeil.

CHANTILLY (Oise).

Grande Médaille d'Or

BEAUVAIS (Oise).

Concours Régional. Grande Médaille de Vermeil.

SENLIS (Oise):

Expos. d'Horticulture. 1^{er} Prix d'honneur et Diplôme d'honneur.*Décernés par la Société d'Horticulture de France.*

MEAUX (Seine-et-Marne).

Exposition d'Horticulture. Prix d'honneur. Grande Médaille d'Or.

GONESSE (Seine-et-Oise).

Prix d'honneur. — Médaille d'Or.

LAGNY (Seine-et-Marne) 1910

Prix d'honneur. Objet d'Art.